

MÍSTICO

BEACH COMMUNITY & RESORT
- COSTA RICA -



RESCUE
CENTER
COSTA RICA
at
MÍSTICO

Guía de Identificación de Aves

CORREDOR BIOLÓGICO · MÍSTICO COMMUNITY BEACH & RESORT · PACÍFICO CENTRAL

TEXTO Y FOTOGRAFÍA

Carlos Emmanuel Nuño Pulido · Vanessa Lizano

90 ESPECIES · 2026

Esta guía no es solo un listado. Es una invitación a detenerse y mirar.

Místico nació como un proyecto donde se combina la vida diaria de los costarricenses, con el cuidado del medio ambiente. El 50% de Místico ha sido destinado para mantener el ecosistema de la zona, y con ello la biodiversidad de Flora y Fauna que ahí habita.

Siguiendo ese idealismo, fue que tomamos la decisión de generar esta guía de identificación de las aves que habitan Místico, con el objetivo principal de generar consciencia sobre la biodiversidad que podemos encontrar en nuestro día a día en Místico.

A su vez, esta guía es el inicio para dar paso a un sinnúmero de proyectos que valoren y quieran apoyar a salvaguardar la diversidad biológica de nuestra comunidad.

Místico, al generar corredores biológicos, cumple con funciones muy importantes para la comunidad, como el reducir el impacto de la fragmentación del hábitat nativo, seguir con el intercambio natural genético entre individuos, proporcionar un lugar seguro para la reproducción de las especies tanto animales, como vegetales.

Es por eso que esta guía no es solo un listado. Es una invitación a detenerse y mirar. Cada ave que van a encontrar aquí fue registrada dentro de Místico, en recorridos reales, a diferentes horas y en diferentes épocas del año. Queremos que quien la tenga en sus manos pueda identificar con facilidad lo que está viendo y, sobre todo, que entienda el valor de lo que está cuidando.

Las aves son excelentes indicadores de la salud de un bosque. Si ellas están aquí, es porque el bosque está vivo. Cuidarlas es cuidarnos también a nosotros.

Gracias por ser parte de este proyecto. Esperamos que esta guía los acompañe en muchos recorridos y que cada avistamiento les recuerde por qué vale la pena conservar.

CARLOS NUÑO PULIDO · VANESSA LIZANO

CÓMO LEER CADA FICHA

Cada especie ocupa una página: familia y número de registro



40 familias • 90 especies registradas en Místico

ACCIPITRIDAE	01–05	MIMIDAE	48
ANATIDAE	06–07	NYCTIBIIDAE	49
ANHINGIDAE	08	PARULIDAE	50
ARDEIDAE	09–15	PASSERELLIDAE	51
BURHINIDAE	16	PELECANIDAE	52
CAPRIMULGIDAE	17	PHALACROCORACIDAE	53
CATHARTIDAE	18–19	PICIDAE	54–56
CERYLIDAE	20–22	PROCELLARIIDAE	57
CHARADRIIDAE	23	PSITTACIDAE	58–61
CICONIIDAE	24	RALLIDAE	62–63
COLUMBIDAE	25–30	RAMPHASTIDAE	64–65
CRACIDAE	31–32	STERNIDAE	66
CUCULIDAE	33	STRIGIDAE	67–70
FALCONIDAE	34–37	THAMNOPHILIDAE	71
FREGATIDAE	38	THRAUPIDAE	72–78
FRINGILLIDAE	39	THRESKIORNITHIDAE	79–80
FURNARIIDAE	40–41	TROGLODYTIDAE	81–82
HIRUNDINIDAE	42–43	TURDIAE	83
ICTERIDAE	44–46	TYRANNIDAE	84–89
JACANIDAE	47	TYTONIDAE	90

Las familias siguen el orden del registro original. El número corresponde a la ficha de cada especie, no a la página impresa.



Especies de aves

FOTOGRAFÍA — CARLOS NUÑO PULIDO



FOTOGRAFÍA — CARLOS NUÑO PULIDO

Halcón gris

Buteo plagiatus (Schlegel 1862)

DIURNA

DESCRIPCIÓN

Es un ave grande, midiendo de 45-65 cm, con un peso de hasta 475 gramos cuando son adultos. Posee un cuerpo de color gris claro, sin patrones visibles en la zona superior del cuerpo, posee una cola de color negro con un patrón de tres rayas blancas, patas de color anaranjadas. Los juveniles presentan coloraciones cafés en la zona superior del cuerpo y líneas alrededor de la zona de la cabeza.

DISTRIBUCIÓN

Se le puede encontrar desde el Suroeste de los Estados Unidos, hasta la mitad del territorio de Costa Rica.

ALIMENTACIÓN

Se alimenta de varias especies de reptiles, entre ellos: Serpientes y lagartos, aunque se puede encontrar alimentándose de pequeños roedores y aves de pequeño tamaño.



FOTOGRAFÍA — CARLOS NUÑO PULIDO · BRADLEY HACKER

Aguililla Caminera

Rupornis magnirostris (Gmelin 1788)

DIURNA

DESCRIPCIÓN

Es un ave grande, midiendo de 33.45 cm, con un peso de hasta 350 gramos cuando son adultos. Posee un cuerpo de color gris oscuro con patrones de líneas blancas en la zona inferior del cuerpo, el pico y ojos son de un color ámbar, las plumas internas de las alas y cola son de un color café con las puntas de color negro.

DISTRIBUCIÓN

Tiene una distribución muy amplia, yendo desde el norte de México hasta el Norte de Argentina en zonas de bosque subtropical.

ALIMENTACIÓN

Es un ave carnívora cuyas presas son: Serpientes y lagartos, aunque se puede encontrar alimentándose de pequeños roedores y aves de pequeño tamaño.



FOTOGRAFÍA — BRYAN CALK · RONALDO CHÁVEZ

Gavilán Cangrejero

Buteogallus anthracinus (Depre, 1830)

DIURNA

DESCRIPCIÓN

Es un ave grande, este puede medir de entre los 43-53 cm y tener un peso de hasta 930 gramos cuando son adultas. Tiene un cuerpo de color negro, la cola presenta una línea de color blanco cerca de la base, su pico y patas son de un color amarillo y los especímenes jóvenes son de un color café en la parte superior del cuerpo.

DISTRIBUCIÓN

Se le puede encontrar desde el Norte de México hasta el Norte de Colombia y Venezuela. Normalmente se le puede encontrar cerca de las playas o zonas de mangle descansando.

ALIMENTACIÓN

Principalmente se alimenta de cangrejos terrestres y de río, aunque al tratarse de una especie oportunista se le puede encontrar comiendo otros animales como: reptiles, aves pequeñas, roedores e incluso huevos.



FOTOGRAFÍA — FRANCISCO MARTÍNEZ · ANDRÉS VÁSQUEZ NOBOA

Azor Zancón

Geranospiza caerulescens (Vieillot, 1817)

DIURNA

DESCRIPCIÓN

Es un ave grande, midiendo 46 cm, con un peso de hasta 400 gramos cuando son adultos. Tienen un cuerpo de color gris azulado u oscuro con un marmoleado blanco en la zona del pecho, posee patas biarticuladas y más largas que el promedio de las otras especies de la familia, son de un color anaranjado y poseen una cola ancha con dos líneas de color negro. Los juveniles tienen plumas con rasgos blanquecinos en la zona del rostro.

DISTRIBUCIÓN

Se le puede encontrar desde el Norte de México hasta la zona norte de Argentina. Se encuentra mayormente en las zonas tropicales y bosques.

ALIMENTACIÓN

Se alimenta de otros animales, como los son: reptiles, pequeñas aves y pequeños mamíferos.



FOTOGRAFÍA — JORGE TORRES APOLO · DICK MURRAY

Busardo Colicorto

Buteo brachyurus (Vieillot, 1816)

DIURNA

DESCRIPCIÓN

Se trata de un ave de tamaño mediano, midiendo entre 38 a 45 cm y pesando entre los 400 a 500 gramos en promedio. Posee un cuerpo de color blanco. Las alas son de un color chocolate o negro. La cola es del mismo color que las alas, y presenta franjas horizontales por toda la cola. La cola es más pequeña que en la mayoría de especies de la familia. La espalda y cabeza son de color negro o chocolate. Las patas son de un amarillo brillante. Su pico es en forma de "Garfio". Se pueden encontrar tres variaciones de color del cuerpo: Blanco, Crema y Negro.

DISTRIBUCIÓN

Se distribuye desde el Sur de los Estados Unidos, Florida y hasta el Norte de Argentina y Uruguay.

ALIMENTACIÓN

Se alimenta de mamíferos pequeños, reptiles, peces y otras aves.



FOTOGRAFÍA — AVES DE ORAN · MARCO VALENTINI

Pato Criollo

Cairina moschata (Linnaeus, 1758)

DIURNA

DESCRIPCIÓN

Es un ave grande, midiendo de 64-75 cm, con un peso de hasta 6.8 kilogramos, en el caso de los machos, siendo las hembras un poco más pequeñas. Posee un cuerpo de color negro mate y alas de color verde muy oscuro debido a la iridiscencia que presentan sus plumas con algunas plumas de color blanco situadas, mayormente, por la zona de la cabeza. Las hembras son de un color blanco y las crías son de un color amarillo con tonos negros. Presentan patas palmeadas y una cara de color roja sin plumas.

DISTRIBUCIÓN

Se le puede encontrar desde México hasta el norte de Argentina, cerca de cuerpos de agua dulce, como lago, ríos, arroyos.

ALIMENTACIÓN

Se alimenta de varias plantas acuáticas y de algunos artrópodos que pueden llegar a encontrar cerca de donde se encuentran.



FOTOGRAFÍA — JAN VAN DER VEER · CARLOS NUÑO PULIDO

Pijije

Dendrocygna autumnalis (Linneaus. 1758)

DIURNA

DESCRIPCIÓN

Es un ave de tamaño grande, midiendo de 52 cm en promedio, con un peso de entre 650 gramos a 1 kilogramo, siendo la hembra mas pesada que el macho. Posee un cuerpo de color café rojizo con negro en la zona inferior, con un cuello y cara de color gris, con pico y patas de un color rosa intenso y una corona de color café rojizo que recorre la zona de la columna vertebral.

DISTRIBUCIÓN

Se le puede encontrar desde el noreste de los Estados Unidos, cerca de Canadá hasta el norte de Argentina.

ALIMENTACIÓN

Se alimentan de plantas que crecen cerca de cuerpos de agua.



FOTOGRAFÍA — PETER KAESTNER · HOLGER TEICHMANN

Aninga Americana

Anhinga anhinga (Linnaeus. 1766)

DIURNA

DESCRIPCIÓN

Es un ave de gran tamaño, midiendo de 75-95 cm en promedio y teniendo un peso de hasta un 1.1 kilogramos. Posee un cuerpo de color negro con tonos blancos en la zona de la espalda, las alas son de un color negro con blanco en la zona posterior de las mismas, patas palmeadas de color naranja apagado, un pico alargado y su característica mas notable es su cuello increíblemente largo, por ello se le conoce como ave serpiente. Este le sirve para cazar, ya que la mayoría del tiempo el cuerpo del ave está dentro del agua.

DISTRIBUCIÓN

Se le puede encontrar desde el Noroeste de los Estados Unidos hasta el norte de Argentina. Se les encuentra en zonas de pantanos y mangles.

ALIMENTACIÓN

Se alimenta mayormente de peces que captura con tu pico en forma de lanza.



FOTOGRAFÍA — DORIAN ANDERSON · LUKE SEITZ

Garceta Tricolor

Egretta tricolor (Muller, 1776)

DIURNA

DESCRIPCIÓN

Es un ave de tamaño medio, midiendo de 25-60 cm, con un peso de hasta 310 gramos en promedio cuando son adultos. Su cuerpo presenta coloraciones azul grisáceo en la espalda y blanco en la zona del pecho, su pico es de los más largos entre las especies de garza y garcetas, los adultos presentan un cuello de color morado más claro que el resto del cuerpo y un plumaje con tonalidades café rojizas en los hombros, su cara es de un color amarillo. Los juveniles presentan una coloración café por el cuerpo.

DISTRIBUCIÓN

Se le puede encontrar desde el Noroeste de los Estados Unidos hasta el Norte de Perú. Se les puede encontrar cerca de cuerpos de agua de poca profundidad deambulando y cazando.

ALIMENTACIÓN

Se alimenta de varias especies de peces y pequeños crustáceos que puede capturar en cuerpos de agua.



FOTOGRAFÍA — LUKE SEITZ · ETIENNE ARTIGUA

Garceta azul

Egretta caerulea (Linnaeus, 1758)

DIURNA

DESCRIPCIÓN

Se trata de un ave de tamaño grande, midiendo de 55-60 cm en promedio y pesando unos 350 gramos cuando son adultos. Posee un cuerpo con una coloración azul grisácea, un cuello de color morado, el poco alargado es de un tono azul suave que termina en tonos más oscuros, las patas son de un amarillo verdoso. Los juveniles son de un color blanco y conforme crecen aparece el color característico de la especie.

DISTRIBUCIÓN

Se encuentra desde el noroeste de los Estados Unidos hasta Chile y en la zona del Caribe. Se le suele encontrar en cuerpo de agua dulce.

ALIMENTACIÓN

Se alimenta de peces y crustáceos que puede atrapar con su pico.



FOTOGRAFÍA — CARLOS NUÑO PULIDO

Garcita Verde

Butorides virescens (Linnaeus, 1758)

DIURNA

DESCRIPCIÓN

Es un ave de tamaño grande, midiendo 41-46 cm en promedio y pesando entre los 180 gramos cuando son adultas. Posee un cuerpo de color verde negruzco, el cuello es de un color tinto, las alas poseen un color gris con iridiscencia verde, patas de color amarillo y un copete de color gris azulado. Las crías presentan colores mas apagados que los adultos.

DISTRIBUCIÓN

Se le puede encontrar desde el Noroeste de los Estados Unidos en época de anidación. Durante el resto del año se encuentra desde el Norte de México hasta el Norte de Colombia y Venezuela.

ALIMENTACIÓN

Se alimenta de varias especies de peces pequeños.



FOTOGRAFÍA — CARLOS NUÑO PULIDO · ALEX LAMOREAUX

Garza Blanca

Ardea alba (Gmelin 1788)

DIURNA

DESCRIPCIÓN

Se trata de un ave de gran tamaño, midiendo hasta 1 metro de altura y pesando entre los 700 a 1500 gramos en promedio. Posee un cuerpo de color blanco, si patrones visibles, un pico de lanza de color amarillo y sus patas presentan una coloración negra. Además de contar con un largo cuello, representativo de la especie.

DISTRIBUCIÓN

Se pueden encontrar alrededor de todo el mundo, ya que se trata de una especie cosmopolita, y es normal encontrarlas cerca de arrozales, cuerpos de agua poco profundos, cerca de zonas de ganado, etc.

ALIMENTACIÓN

Se alimenta de varias especies de peces, crustáceos, insectos y otros pequeños animales.



FOTOGRAFÍA — ANDREW SIMON · BRANDON NIDIFFER

Garza Bueyera

Ardea ibis (Linnaeus, 1758)

DIURNA

DESCRIPCIÓN

Se trata de un ave de tamaño grande, midiendo entre los 46-56 cm en promedio y tienen un peso de hasta 510 gramos en promedio. Posee un cuerpo de color blanco, con plumaje de color café claro en la zona de la espalda y pecho, además de un copete del mismo color, situado en la cabeza, su pico tiene un color amarillo-anaranjado y las patas de color amarillas.

DISTRIBUCIÓN

Se le puede encontrar por todo el continente americano, además de África y Europa. Se le suele ver cerca de cuerpos de agua dulce y zonas con ganado o parientes de bovinos.

ALIMENTACIÓN

Se alimentan de crustáceos pequeños, insectos, e incluso de pequeños anfibios.



FOTOGRAFÍA — LUKE SEITZ · DEIDRE ASBJOM

Garza Pico de Bote

Cochlearius cochlearius (Brisson, 1760)

NOCTURNA

DESCRIPCIÓN

Se trata de un ave de tamaño medio, midiendo entre los 50-55 cm y teniendo un peso de 600 gramos en promedio. Posee un cuerpo de color café claro, las alas presentan una coloración gris azulada, las patas tienen un plumaje negro, la zona de la cabeza es de un color blanco grisáceo, grandes ojos de color café, patas de color amarillo verdoso y el su característico pico ancho en forma de bote es de color negro, además de una cresta de color negro que usan para el cortejo.

DISTRIBUCIÓN

Se puede encontrar desde el Norte de México hasta el Norte de Colombia, aunque se tienen registros hasta el Sur de Brasil. Se le ve en las zonas costeras.

ALIMENTACIÓN

Se alimenta de varias especies de peces, crustáceos y anfibios que atrapa.



FOTOGRAFÍA — CARLOS NUÑO PULIDO

Garza Tigre

Tigrisio mamexicanum (Swaison, 1834)

DIURNA

DESCRIPCIÓN

Se trata de un ave de tamaño grande, midiendo de los 76 a los 80 cm y teniendo un peso de hasta 1.2 kilogramos. Posee un cuerpo de color gris jaspeado, con rayas verticales blancas que abarcan toda la zona de la garganta, a su vez, la garganta presenta plumas de color café dando una ilusión de no tener plumas, tiene un rostro de color amarillo y patas de color amarillo verdoso y un pequeño penacho de color oscuro en el tope de la cabeza.

DISTRIBUCIÓN

Se le encuentra desde el Norte de México hasta la zona Norte de Colombia y Venezuela. Se les encuentra en las zonas con cuerpos de agua y en zonas de manglares.

ALIMENTACIÓN

Se alimenta de varias especies de peces, crustáceos y anfibios.



FOTOGRAFÍA — CARLOS NUÑO PULIDO · JAY MCGOWAN

Alcarán Americano

Hesperoburhinus bistriatus (Wagler, 1829)

DIURNA

DESCRIPCIÓN

Se trata de un ave de tamaño grande, midiendo hasta los 46 cm y teniendo un peso de 350 a 740 gramos en promedio. Posee un cuerpo delgado de color blanco con alas y cuello de un color café jaspeado, patas largas de color amarillo, la cara es de color blanco con dos líneas negras arriba de la cabeza, un pico corto de color negro y grandes ojos de color amarillo.

DISTRIBUCIÓN

Se puede encontrar desde el Sur de México, hasta el Sur de Costa Rica. Saltándose a Panamá y llegando a Colombia y Venezuela.

ALIMENTACIÓN

Su dieta consiste en, su mayoría, de insectos que caza.



FOTOGRAFÍA — CLAUDIA BRASILEIRO · BLAIR DUDECK

Chotacabra

Nyctidromus albicollis (Gmelin, 1789)

NOCTURNA

DESCRIPCIÓN

Se trata de una ave de tamaño pequeño, midiendo de los 27-30 cm y pesando de los 40 a los 90 gramos. Posee un cuerpo de una combinación de colores cafés, cafés rojizos, negro, blanco y dorados, esto le ayuda a camuflarse en la tierra ya que ellas se les encuentra descansando en los caminos de tierra. Cuando vuelan se puede apreciar que las alas presentan puntas de color blanco, al igual que su cola. Posee un pico corto de color negro.

DISTRIBUCIÓN

Se les puede encontrar desde el Norte de México, cerca de Texas hasta el Sur de Brasil.

ALIMENTACIÓN

Se alimentan de insectos que atrapan del suelo, donde se les suele encontrar descansando.



FOTOGRAFÍA — JAN VAN DER VEER

Zopilote Aura

Cathartes aura (Linnaeus, 1758)

DIURNA

DESCRIPCIÓN

Se trata de un ave de tamaño grande, midiendo de 64-81 cm y pesando hasta los 2 kilogramos. Posee un cuerpo de color negro -café oscuro, las alas tienen las plumas interiores de color blanco, la cabeza es color rojo sin plumas con un pico corto en forma de gancho y de color marfil y patas de color blanco a rojo.

DISTRIBUCIÓN

Se les puede encontrar desde Canadá hasta la Patagonia en Argentina.

ALIMENTACIÓN

Se alimenta de animales muertos de distintos tamaños que va encontrando.



FOTOGRAFÍA — LUKE SEITZ · DARREN CLARK

Zopilote Negro

Coragyps atratus (Bechstein 1793)

DIURNA

DESCRIPCIÓN

Se trata de un ave de tamaño grande, midiendo entre los 56-74 cm y pesando unos 1.6 a 3 kilogramos. Posee un cuerpo completamente negro, con parches en la zona interior de su ala y en la punta de las mismas de color blanco, su cabeza es de un color gris oscuro-negro y sin plumas.

DISTRIBUCIÓN

Se distribuye desde el Norte de los Estados Unidos, hasta la zona Norte de la Patagonia en Argentina.

ALIMENTACIÓN

Se alimenta de cualquier animal que haya muerto recientemente.



FOTOGRAFÍA — JAN VAN DER VEER

Martin Tropical

Megascops torquata (Linnaeus, 1766)

DIURNA

DESCRIPCIÓN

Se trata de un ave de tamaño medio, midiendo desde los 36-44 cm y pesando entre los 150-350 gramos. Posee un cuerpo de color gris azulado, un copete despeinado de las mismas tonalidades, el pecho del macho es de un color rojizo, mientras que el de la hembra es de un color azul pizarra, ambos presentan un collar blanco en el cuello, patas de color café y un pico largo que le sirve para cazar a sus presas.

DISTRIBUCIÓN

Se le puede encontrar desde el Norte de México hasta el Sur de Brasil, teniendo una población en la zona de Chile, hasta la Patagonia Argentina. Se les encuentra en ríos o cuerpos de agua.

ALIMENTACIÓN

Se alimenta de peces que cazan por zambullida.



FOTOGRAFÍA — CHARLIE BRUGGEMANN · PETER F

Martin Gigante

Megascops alcyon (Linnaeus, 1758)

DIURNA

DESCRIPCIÓN

Se trata de un ave de tamaño medio, midiendo de 28-35 cm y pesando entre los 140 a 170 gramos. Posee un cuerpo de color gris azulado, con un copete despeinado del mismo tono, presenta un collar de color blanco en el cuello y una franja de color rojiza en el pecho en el caso de los machos, las hembras presentan la misma franja un poco más abajo del pecho y presenta un parche de color gris azulado en el pecho, las plumas de las alas terminan en puntas negras con puntos blancos.

DISTRIBUCIÓN

Se le puede encontrar desde Canadá hasta el Norte de Colombia y Venezuela.

ALIMENTACIÓN

Se alimenta de varias especies de peces y algunos crustáceos.



FOTOGRAFÍA — JAN VAN DER VEER

Martin Amazónico

Chloroceryle amazona (Latham, 1790)

DIURNA

DESCRIPCIÓN

Se trata de un ave de tamaño medio, midiendo desde los 29-30 cm y pesando entre 110 gramos en promedio. Posee un cuerpo de color verde aceitoso-oliva, con un copete prominente del mismo color que el cuerpo, posee un collar de color blanco en la zona del cuello y un parche de color rojizo en la zona del pecho, pero solo los machos, las hembras presentan un parche de color verde aceitoso-oliva en su lugar, su pico es más grande en comparación con el cuerpo.

DISTRIBUCIÓN

Se encuentra desde el Sur de México hasta la mitad de Argentina en zonas de tierras bajas.

ALIMENTACIÓN

Se alimenta de varias especies de peces



FOTOGRAFÍA — CARLOS NUÑO PULIDO · JAN VAN DER VEER

Ave Fría

Vanellus chilensis (Molina, 1782)

DIURNA

DESCRIPCIÓN

Se trata de un ave de tamaño medio, midiendo entre los 30-38 cm y pesando los 250 a 400 gramos. Posee un cuerpo de color gris con la parte inferior de color blanco y un pecho de color negro, los hombros tienen una coloración cobriza con tonos verdes, una franja vertical de color negro en la cara frente a los ojos, ojos de color rojo, un pequeño pico rosado que termina en negro, patas largas de color rojo, alas con plumas centrales de color blanco y plumas inferiores de color negro.

DISTRIBUCIÓN

Se le puede encontrar desde el Sur de México, cerca de Guatemala hasta la Patagonia Argentina. Se le suele encontrar cerca de pastizales, llanuras o zonas abiertas.

ALIMENTACIÓN

Se alimentan de insectos.



FOTOGRAFÍA — RIO DANTE · JAY MCGOWAN

Cigüeña Americana

Mycteria americana (Linneaus, 1758)

DIURNA

DESCRIPCIÓN

Se trata de un ave de gran tamaño, midiendo entre los 83 a 120 cm y pesando entre los 2 a 3.3 kilogramos. Posee un cuerpo de color blanco. La cabeza es de color gris a negro sin plumas visibles, el pico es largo, parecido al de las garzas, pero más ancho y un poco curvo hacia abajo. Las alas presentan plumas inferiores de color negro y posee patas largas de un color negro con dedos rojizos.

DISTRIBUCIÓN

Se encuentra desde los Estados Unidos hasta el Sur de Brasil. Se le ve cerca de los cuerpos de agua.

ALIMENTACIÓN

Se alimenta de varias especies de peces, crustáceos, anfibios y algunos insectos acuáticos.



FOTOGRAFÍA — JEFF TIMMONS

Tórtola Aliblanca

Zenaida asiatica (Linneaus, 1758)

DIURNA

DESCRIPCIÓN

Se trata de un ave de tamaño mediano, midiendo hasta los 30 cm y pesando entre 140 y 170 gramos aproximadamente. Posee un cuerpo de color marrón, con la zona inferior del cuerpo de color gris. Presentan una coloración azul alrededor del ojo, el cual es de color rojo, las patas son de un color rojo y el las alas tienen un parche de color blanco. En las mejillas tienen una pequeña franja de color negro, el pico es delgado y alargado.

DISTRIBUCIÓN

Se le puede encontrar desde Canadá hasta Panamá. Es un ave que se le puede encontrar en cualquier lugar.

ALIMENTACIÓN

Se alimentan de granos silvestres, frutas, néctar.



FOTOGRAFÍA — MATTHEW GRUBE

Tórtola Rojiza

Columbina talpacoti (Temminck, 1810)

DIURNA

DESCRIPCIÓN

Se trata de un ave de tamaño pequeño, midiendo entre 17 cm y pesando entre los 47 gramos aproximadamente. Posee un cuerpo de color café rojizo. Los machos tienen la cabeza gris, mientras las hembras tienen la cabeza de un color café similar al cuerpo. Ambos presentan un parche canela en la zona inferior del ala, las patas son de color rojo.

DISTRIBUCIÓN

Se les pueden encontrar desde el Suroeste de los Estados Unidos hasta el Norte de Argentina.

ALIMENTACIÓN

Se alimentan de granos silvestres, frutas, insectos que atrapan en la tierra.



FOTOGRAFÍA — GRAHAM MONTGOMERY · VAN REMSEN

Tórtola Mexicana

Columbina inca (Lesson, 1847)

DIURNA

DESCRIPCIÓN

Se trata de un ave de tamaño pequeño, midiendo entre 16.5 a 23 cm y pesando entre los 30 a 58 gramos. Posee un cuerpo de color café muy claro escamoso, la zona del pecho es ligeramente más clara, posee un pico pequeño y alargado de color negro, sus patas son de color rosado.

DISTRIBUCIÓN

Se le puede encontrar desde el Sur de Canadá hasta el Sur de Panamá.

ALIMENTACIÓN

Se alimenta de granos silvestres, pequeños insectos y comida que pueda robar.



FOTOGRAFÍA — DARREN CLARK · RUTH DANELLA

Paloma Arroyera

Leptotila verreauxi (Bonaparte, 1855)

DIURNA

DESCRIPCIÓN

Es un ave de tamaño medio, midiendo entre los 23.5 a 29.5 cm y pesando entre los 96 a 160 gramos aproximadamente. Posee un cuerpo de color café grisáceo, las alas y cola son de una tonalidad de café más oscuro, a su vez, las alas presentan pequeños parches de color canela y puntas blancas en la cola. La cabeza tiene tonalidades rojizas en la zona posterior y el rostro es ligeramente más claro que el cuello. Las patas son de color rojo.

DISTRIBUCIÓN

Se le puede encontrar desde el Norte de México, cerca de Texas hasta el Norte de Argentina.

ALIMENTACIÓN

Se alimentan de semillas y pequeños insectos.



FOTOGRAFÍA — JAN VAN DER VEER · GAIDIS GRANDAS

Paloma Triste

Patagioenas nigrirostris (Sclater, 1860)

DIURNA

DESCRIPCIÓN

Es un ave de tamaño medio, midiendo entre los 26 a 31 cm y pesando entre los 128 a 240 gramos. Posee un cuerpo de color rosa oscuro, las alas y cola son de un tono café, las patas son de color rojo y los ojos son rojos. Es una paloma que acostumbra vivir en la copa de los árboles de bosques, por lo tanto, es difícil de ver.

DISTRIBUCIÓN

Se encuentra desde el Sur de México hasta el Sur de Panamá, siendo Centroamérica donde mayormente se puede encontrar.

ALIMENTACIÓN

Se alimenta de insectos, semillas y frutas.



FOTOGRAFÍA — GUILLERMO SABORÍO VEGA · ISAÍAS MORATAYA

Paloma Morada

Patagioenas flavirostris (Wagler, 1831)

DIURNA

DESCRIPCIÓN

Se trata de un ave de tamaño medio midiendo entre los 30 a 35 cm y pesando 270 gramos en promedio. Posee un cuerpo de color morado rojizo. Las plumas y cola presentan un color gris azulado. Las alas presentan un parche de color morado rojizo, muy similar al del cuello y el pecho. El pico y patas son de color rojo.

DISTRIBUCIÓN

Se distribuye desde el Norte de México hasta el Norte de Panamá.

ALIMENTACIÓN

Se alimenta principalmente de granos y frutos.



FOTOGRAFÍA — JAN VAN DER VEER

Chachalaca Cabeza Gris

Ortalis cinereiceps (Grey, 1876)

DIURNA

DESCRIPCIÓN

Se trata de un ave de tamaño grande, midiendo entre los 46 a 58 cm y pesando hasta los 500 gramos en promedio. Posee un cuerpo de color café, en la zona de las patas es de un tono más claro de café. Posee una larga cola de color gris que termina en puntas blancas, las alas son de un color rojizo. La cabeza es de un color gris con ojos cafés. Las patas son de un color gris.

DISTRIBUCIÓN

Se le puede encontrar desde el Sur de Honduras hasta el Norte de Colombia.

ALIMENTACIÓN

Se alimentan de granos, frutas, hojas tiernas y de insectos.



FOTOGRAFÍA — CARLOS NUÑO PULIDO · ANDRÉS VÁSQUEZ NOBOA

Pava Crestada

Penelope purpurascens (Wagler, 1830)

DIURNA

DESCRIPCIÓN

Se trata de un ave de tamaño grande, midiendo entre los 70 a 91 cm y pesando entre 1.6 a 2.7 kilogramos. Posee un cuerpo gris pardo con bordes blancos, una larga cola que llega a tener tonalidades rojizas, tienen un pequeño penacho, la cara carece de plumas y tiene una coloración azul. La garganta es de color rojo intenso sin plumas. Las patas son de un color rojizo.

DISTRIBUCIÓN

Se encuentra desde el Sur de México hasta el Norte de Colombia, Venezuela y Ecuador.

ALIMENTACIÓN

Se alimentan de frutas, plantas tiernas y ocasionalmente de insectos.



FOTOGRAFÍA — CARLOS NUÑO PULIDO

Garrapatero Pijuy

Crotophaga sulcirostris (Swaison, 1827)

DIURNA

DESCRIPCIÓN

Se trata de un ave de tamaño medio, midiendo entre los 30 a 35 cm y pesando entre 70 a 120 gramos. Posee un cuerpo de color negro con iridiscencia azules, poseen una cola larga del mismo color y un pico característico por ser grueso, acanalado con la parte superior curva.

DISTRIBUCIÓN

Se pueden encontrar desde el Sur de los Estados Unidos hasta la Zona Norte de Venezuela y al Sur de Perú.

ALIMENTACIÓN

Se alimentan de insectos, pequeños reptiles, etc. Es por ello es común verlos cerca de campos con ganado.



FOTOGRAFÍA — CARLOS NUÑO PULIDO

Chimachima

Daptrius chimachima (Vieillot, 1816)

DIURNA

DESCRIPCIÓN

Se trata de un ave de tamaño grande, midiendo entre los 37-46 cm y pesando entre los 280 a 360 gramos en promedio. Posee un cuerpo de color blanco con alas y cola de color café oscuro, en la cara presenta una franja negra alrededor de los ojos. La cara es de color amarillo con un pico recurvo color gris y tiene patas de color blanco. Los juveniles son de un color beige con rayas oscuras por todo el cuerpo.

DISTRIBUCIÓN

Se distribuye desde el Sur de Honduras hasta el Norte de Argentina.

ALIMENTACIÓN

Tienen una dieta carnívora, está incluye: pequeños mamíferos, reptiles, anfibios, etc.



FOTOGRAFÍA — JAN VAN DER VEER · JOSHUA VAN DER MEULEN

Caracara

Caracara plancus (Miller, 1777)

DIURNA

DESCRIPCIÓN

Se trata de un ave de tamaño grande, midiendo entre los 50 a 65 cm y pesando entre el 1 a 1.2 kilogramos aproximadamente. Posee un cuerpo de color blanco, con tonos jaspeados en la zona del pecho y cuello, en la zona de las patas es de color negro. Las alas y cola son de un color negro con destellos blancos en la zona interior de las mismas. Tiene patas largas de color amarillo, la cara es de color blanco y presenta un copete hacia atrás de color negro. El pico tiene una coloración naranja que termina de color gris.

DISTRIBUCIÓN

Se distribuye desde el Sur de los Estados Unidos hasta la Patagonia Argentina.

ALIMENTACIÓN

Se alimentan de reptiles y mamíferos pequeños.



FOTOGRAFÍA — FERNANDO BURGALIN SEQUERIA · DAVID MONROY RENGIFO

Halcón Murcielaguero

Falco rufigularis (Daudin, 1800)

DIURNA

DESCRIPCIÓN

Se trata de un ave de tamaño medio, midiendo entre 22-30 cm y pesando entre los 110-240 gramos aproximadamente. Posee un cuerpo de color negro, presenta un collar de color blanco que llega hasta la zona del pecho, la zona de las patas tiene una coloración café rojizo. Tienen patas de color amarillo.

DISTRIBUCIÓN

Tiene distribución desde el Norte de México hasta el Sur de Brasil.

ALIMENTACIÓN

Se alimentan de aves pequeñas, murciélagos e insectos.



FOTOGRAFÍA — JAN VAN DER VEER

Halcón Guaco

Herpetotheres cachinnans (Linnaeus, 1758)

DIURNA

DESCRIPCIÓN

Se trata de un ave de tamaño grande, midiendo hasta los 44cm y pesando entre los 560 a 800 gramos. Posee un cuerpo de color blanco, las alas son de un color café oscuro. Presenta un antifaz de color negro en la cara y un copete de color blanco. Las plumas de la cola presentan tres franjas horizontales.

DISTRIBUCIÓN

Se le puede encontrar desde el Norte de México hasta el Sur de Brasil.

ALIMENTACIÓN

Se alimenta principalmente de serpientes, tanto terrestres como arborícolas.



FOTOGRAFÍA — CARLOS NUÑO PULIDO

Fragata Real

Fregata magnificens (Mathews, 1914)

DIURNA

DESCRIPCIÓN

Se trata de un ave de tamaño grande, midiendo entre los 90 a 115 cm y pesando entre el 1 a 2 kilogramos de peso. Posee un cuerpo de color negro azabache, con una larga cola en forma de V. Los machos presentan un saco ugular de color rojo intenso, mientras que las hembras presentan un parche de color blanco en lugar del saco ugular. Las crías presentan una coloración blanca en la zona del pecho, cuello y cara. Posee un pico alargado que termina en una punta hacia abajo.

DISTRIBUCIÓN

Se distribuyen desde los Estados Unidos hasta Brasil y el Caribe. Solo se les encuentra en zonas costeras o islas cercanas a la costa.

ALIMENTACIÓN

Se alimentan de calamares y peces.



FOTOGRAFÍA — JAN VAN DER VEER · FERNANDO BURGALIN SEQUERIA

Eufonía Corona Amarilla

Euphonia luteicapilla (Gmelin 1788)

DIURNA

DESCRIPCIÓN

Se trata de un ave de tamaño pequeño, midiendo 9.5 cm aproximadamente y pesando entre los 14 gramos. Posee un cuerpo de color amarillo, la zona de la espalda es de color azul intenso. Las alas y cola presentan el mismo tono de color azul que dé la espalda. Tiene un copete de color amarillo. Las hembras por su parte, son de un tono de color verde oliva en las zonas que los machos presentan el color azul. Tienen un pico corto y grueso y patas de color gris.

DISTRIBUCIÓN

Se les puede encontrar desde el Norte de Honduras hasta el Sur de Panamá.

ALIMENTACIÓN

Se alimentan principalmente de frutos suaves y bayas.



FOTOGRAFÍA — ALEX MOLINA · JAY MCGOWAN

Picolezna Liso

Xenops mexicanus (Sclater, 1857)

DIURNA

DESCRIPCIÓN

Se trata de un ave de tamaño pequeño, midiendo entre los 11 a 13 cm y pesando 12 gramos en promedio. Posee un cuerpo de color café, la zona del cuello y pecho son de un tono más claro. Las alas y cola son de un color canela con plumas que terminan en color negro. En la zona de las mejillas presentan una pequeña franja de color blanco.

DISTRIBUCIÓN

Se distribuye desde el Sur de México hasta el Sur de Panamá.

ALIMENTACIÓN

Se alimentan principalmente de insectos.



FOTOGRAFÍA — WILLIAM HEMSTROM · ANNE BIELAMOWICZ

Trepatroncos Rayado

Lepidocolaptes souleyetii (Lafresnaye, 1849)

DIURNA

DESCRIPCIÓN

Se trata de un ave de tamaño pequeño midiendo entre 19 cm y pesando entre los 28 gramos de peso. Posee un cuerpo de color crema con rayas verticales de color café y negro por todo el cuerpo y cabeza. Las alas y cola son de un color marrón rojizo. Posee un pico largo y delgado que se curva hacia abajo.

DISTRIBUCIÓN

Se distribuye desde el Istmo de México, hasta el Norte de Surinam y Perú.

ALIMENTACIÓN

Se alimentan principalmente de insectos.



FOTOGRAFÍA — IAN DAVIES · ALFONSO AUERBACH

Golondrina Pechigrís

Progne chalybea (Gmelin, 1789)

DIURNA

DESCRIPCIÓN

Se trata de un ave de tamaño pequeño, midiendo entre los 16 a 20 cm y pesando cerca de 40 gramos. Posee un cuerpo de color blanco, el cuello es de color gris. La cabeza presenta un tono de azul brillante, la cola es de color gris, parecido al que se presenta en el cuello. Las alas son azules, con el mismo tono que la cabeza y terminan en plumas grises. La hembra presenta un color café en las alas y cabeza, en vez del azul que presenta el macho de la especie.

DISTRIBUCIÓN

Se les puede encontrar desde la mitad de México, hasta el Sur de Brasil.

ALIMENTACIÓN

Se alimentan de insectos.



FOTOGRAFÍA — CARLOS NUÑO PULIDO

Golondrina Manglera

Tachycineta albilinea (Lawrence, 1863)

DIURNA

DESCRIPCIÓN

Se trata de un ave de tamaño pequeño, midiendo entre los 13 cm en promedio y pesando 14 gramos en promedio. Posee un cuerpo de color blanco. La zona de la cabeza y espalda presenta un color verde metálico, la cola es de color blanco y termina en el mismo tono de verde de la espalda, debido a esto parece que tienen un parche blanco por debajo de las alas. Tienen un pequeño antifaz triangular de color negro en la zona de los ojos. Tienen un pequeño pico de color gris.

DISTRIBUCIÓN

Se distribuyen desde México, las zonas del Golfo de California y del Golfo de México, hasta el Sur de Panamá.

ALIMENTACIÓN

Se alimentan de insectos.



FOTOGRAFÍA — JEROME FOSTER · TOM MURRAY

Loica Pechirrojo

Leistes militaris (Linnaeus, 1758)

DIURNA

DESCRIPCIÓN

Se trata de un ave de tamaño pequeño, midiendo 16 a 19 cm y pesando entre los 40 a los 48 gramos en promedio. Posee un cuerpo de color negro azabache con un parche de color rojo intenso en el pecho. Las hembras son de un color café claro con plumas jaspeadas y dos franjas negras arriba de los ojos.

DISTRIBUCIÓN

Se les encuentra desde el Norte de Nicaragua hasta el Norte de Bolivia.

ALIMENTACIÓN

Se alimentan de insectos y semillas.



FOTOGRAFÍA — CARLOS NUÑO PULIDO

Zanate Mexicano

Quiscalus mexicanus (Gmelin, 1788)

DIURNA

DESCRIPCIÓN

Se trata de un ave de tamaño medio, midiendo entre los 33 a 43 cm en promedio y pesando 160 gramos en promedio. Los machos presentan un cuerpo de color negro con tonos azules iridiscentes y morados en la zona de la cabeza. Las hembras son de color café en el cuerpo, con alas y cola de color negro. Ambos presentan una larga cola de color negro.

DISTRIBUCIÓN

Se distribuye desde el Norte de los Estados Unidos hasta el Sur de Panamá.

ALIMENTACIÓN

Se alimentan de semillas, frutas, insectos y cualquier cosa que puedan obtener.



FOTOGRAFÍA — JOSEPH DEL HOYO

Tordo Cantor

Dives dives (Depre, 1830)

DIURNA

DESCRIPCIÓN

Se alimenta de varias especies de reptiles, entre ellos: Serpientes y lagartos, aunque se puede encontrar alimentándose de pequeños roedores y aves de pequeño tamaño.

DISTRIBUCIÓN

Se encuentra desde el Norte de México, en la zona del Golfo de hasta la mitad de Panamá.

ALIMENTACIÓN

Se alimentan de frutas, insectos, semillas y néctar.



FOTOGRAFÍA — IAN DAVIES · JEAN BONILLA

Jacana Centroamericana

Jacana spinosa (Linnaeus, 1758)

DIURNA

DESCRIPCIÓN

Se trata de un ave de tamaño pequeño, midiendo entre 23 a 26 cm y pesando entre los 90 a 160 gramos. Posee un cuerpo de color rojo-café, el cuello y cara son de color negro. En la cara presenta un parche de color amarillo arriba de los ojos. El interior de las alas es de color amarillo. El pico es delgado y alargado de color amarillo. Sus patas son largas con dedos delgados y muy largos, debido a que caminan sobre plantas acuáticas y presenta un color grisáceo.

DISTRIBUCIÓN

Se distribuye desde la Mitad de México, el Caribe y hasta el Sur de Panamá.

ALIMENTACIÓN

Se alimentan de insectos, caracoles, pequeños peces, semillas y flores.



FOTOGRAFÍA — JAY MCGOWAN · BRIAN MCGEE

Cenzontle Tropical

Mimus gilvus (Vieillot, 1808)

DIURNA

DESCRIPCIÓN

Se trata de un ave de tamaño medio, midiendo entre los 23 a 26 cm y pesando 55 gramos en promedio. Posee un cuerpo delgado de color blanco. La espalda es de color gris claro. Las alas poseen plumas de color negro en la zona externa de la misma. La cola es de color negro, la base es de color gris, a su vez, posee dos parches blancos al final de la cola, en la zona exterior de la misma. Posee un pico alargado y curvo. Las patas son negras.

DISTRIBUCIÓN

Se distribuye desde la mitad de México, hasta el Norte de Ecuador y Surinam.

ALIMENTACIÓN

Se alimenta de insectos, bayas, frutas, lagartos pequeños, huevos, etc.



FOTOGRAFÍA — STEFAN HIRSCH · NOREEN BAKER

Urutaú

Nyctibius griseus (Gmelin, 1789)

NOCTURNA

DESCRIPCIÓN Se trata de un ave de tamaño medio, midiendo entre los 33 a 38 cm y pesando entre 145 a 200 gramos. Posee un cuerpo de color café grisáceo con patrones irregulares a lo largo de todo el cuerpo. Tiene una gran cabeza con ojos grandes de color amarillos. Presenta una línea de color negro en forma de bigote.

DISTRIBUCIÓN Se distribuye desde el Sur de Nicaragua hasta el Norte de Argentina.

ALIMENTACIÓN Se alimentan de insectos que caza al mimetizarse con ramas.



FOTOGRAFÍA — BLAIR DUDECK · LUKE BERG

Coronita Gris

Geothlypis poliocephala (Baird, 1865)

DIURNA

DESCRIPCIÓN

Se trata de un ave de tamaño pequeño midiendo entre los 14 cm y pesando entre 13 a 17 gramos en promedio. Posee un cuerpo de color amarillo. Cerca de las alas el color es más café. Las alas son de un color café claro. La cola es del mismo tono que la de las alas. Presenta un antifaz de color negro en los ojos y una corona de color gris que recorre la zona posterior del cuello. La hembra de la especie es casi identificada al macho, solo por una coloración un poco más apagada y carecer del antifaz del mismo.

DISTRIBUCIÓN

Se distribuye desde la mitad de México hasta la mitad de Panamá.

ALIMENTACIÓN

Se alimenta de insectos y otros invertebrados.



FOTOGRAFÍA — RYAN SHEAN · FRANCIS CANTO JR

Chingolo

Zonotrichia capensis (Muller, 1776)

DIURNA

DESCRIPCIÓN

Se trata de un ave de tamaño pequeño midiendo entre los 13 y 15 cm y pesando entre 16 a 30 gramos en promedio. Posee un cuerpo café con un patrón jaspeado en las alas y en la espalda. La garganta es de color blanco y debajo presenta un fino collar de color naranja. La cara es de color gris con cinco líneas negras, éstas pasan por los ojos, debajo de ellos y asemejan una corona alargada.

DISTRIBUCIÓN

Se distribuye desde Chiapas, México hasta la Patagonia Argentina, evitando la Amazonía.

ALIMENTACIÓN

Se alimenta de insectos, bayas, frutos, hojas y granos.



FOTOGRAFÍA — CARLOS NUÑO PULIDO · DAN VICKERS

Pelícano Pardo

Pelecanus occidentalis (Linnaeus, 1766)

DIURNA

DESCRIPCIÓN

Se trata de un ave de tamaño enorme, midiendo entre 1 a 1.40 metros y pesando entre los 2 a 5 kilogramos aproximadamente. Posee un cuerpo de color café grisáceo. Las alas son de un tono más claro, el cuello es de color blanco. La cara es de color negra y la cabeza es de color amarillo. Posee un pico largo con una bolsa uular que usa que almacenar peces. Los juveniles son de color café con la cara de color blanco.

DISTRIBUCIÓN

Se distribuye desde Canadá hasta las Guayanas y Perú. Se encuentra exclusivamente en las zonas costeras.

ALIMENTACIÓN

Se alimentan de peces y crustáceos.



FOTOGRAFÍA — JAN VAN DER VEER · DARREN CLARK

Cormorán

Nannopterum brasilianum (Gmelin, 1789)

DIURNA

DESCRIPCIÓN


Se trata de un ave de tamaño grande, midiendo entre los 60 a 66 cm y pesando entre 1 a 1.5 kilogramos aproximadamente. Posee un cuerpo de color negro, tiene un cuello largo. La cara es de color naranja sin plumas y bordeada de plumas de color blanco. Posee un pico alargado que se curva hacia abajo al final del mismo y presenta un color gris. Sus ojos son de color verde.

DISTRIBUCIÓN

Se distribuye desde el Norte de Estados Unidos, el Caribe hasta la Patagonia Argentina.

ALIMENTACIÓN

Se alimentan de peces pequeños.



FOTOGRAFÍA — CARLOS NUÑO PULIDO · DONDANKO

Carpintero Listonado

Dryocopus lineatus (Linnaeus, 1766)

DIURNA

DESCRIPCIÓN

Se trata de un ave de tamaño medio, midiendo entre 30 a 36 cm y pesando entre 190 a 220 gramos. Posee un cuerpo de color café jaspeado, las alas son de color negro. El cuello es de color negro con dos líneas blancas a los lados que se extienden hasta el pico. La cabeza es de color negro. Presenta un copete prominente de color rojo intenso y una papada del mismo color. Posee dos líneas blancas en las alas.

DISTRIBUCIÓN

Se distribuye desde la mitad de México hasta el Sur de Brasil.

ALIMENTACIÓN

Se alimentan de larvas e insectos que viven en los árboles.



FOTOGRAFÍA — BRIAN SULLIVAN · CAROL ORTENZIO

Carpintero de Hoffman

Melanerpes hoffmannii (Cabanis, 1862)

DIURNA

DESCRIPCIÓN

Se trata de un ave de tamaño pequeño midiendo entre los 18 cm aproximadamente y pesando hasta los 68 gramos en promedio. Posee un cuerpo de color café claro, las alas y cola presentan una coloración jaspeada. En la cabeza presentan una corona de color amarillo y rojo, siendo el rojo el que se encuentra en la zona posterior de la cabeza.

DISTRIBUCIÓN

Se distribuye desde el Sur de El Salvador hasta el Sur de Costa Rica.

ALIMENTACIÓN

Se alimenta de insectos y larvas, frutos y néctar.



FOTOGRAFÍA — NEIL DIAZ · PETER & JANE WOLFE

Carpintero Cabecirroja

Melanerpes rubricapillus (Cabanis, 1862)

DIURNA

DESCRIPCIÓN

Se trata de un ave de tamaño pequeño, midiendo entre 16 a 18.5 cm y pesando entre 40 a 65 gramos. Posee un cuerpo de color café claro. Las alas y cola presentan una coloración jaspeada. En la zona ventral tiene un parche de color rojo. Posee una corona de color rojo y naranja que baja hasta la zona de la espalda.

DISTRIBUCIÓN

Se distribuye desde el Norte de Costa Rica hasta la mitad de Colombia y Venezuela.

ALIMENTACIÓN

Se alimentan de insectos, larvas, frutos y néctar.



FOTOGRAFÍA — CARLOS NUÑO PULIDO

Pardela de Galápagos

Puffinus subalaris (Ridgway, 1897)

DIURNA

DESCRIPCIÓN

Se trata de un ave de tamaño medio midiendo entre los 29 a 31 cm y pesando entre 120 a 225 gramos. Posee un cuerpo de color café, la zona ventral y del pecho son de color blanco hasta la mitad de la cara. La parte interna de las alas son de color blanco. Posee un pico largo que termina en una curva hacia abajo de color gris.

DISTRIBUCIÓN

Se distribuye en la zona del Pacífico, desde Sinaloa, México hasta las islas Galápagos. Se les ve anidando en islas mayormente.

ALIMENTACIÓN

Se alimentan de calamares, peces y crustáceos.



FOTOGRAFÍA — CARLOS NUÑO PULIDO · DORIAN ANDERSON

Lora Roja

Ara macao (Linnaeus, 1758)

DIURNA

DESCRIPCIÓN

Se trata de un ave de tamaño grande midiendo entre los 85 a 95 cm de largo y pesando alrededor de 1 kilogramo. Posee un cuerpo de color rojo intenso. Las alas son de un color rojo, amarillo y azul ubicados de manera descendente, se llegan apreciar plumas con puntas verdes. Su cola es muy larga, con plumas que llegan a medir los 40 cm de la largo, siendo de color azules y rojas, siendo las azules la más pequeñas y cercanas a la base de la espalda. Tienen una cara sin plumas de color blanco y un pico en forma de gancho, siendo la parte superior más grande que la inferior, teniendo un color marfil y negro respectivamente.

DISTRIBUCIÓN

Se distribuyen desde el Sur de México hasta la mitad de Brasil. Se les encuentra en zonas de selvas tropicales.

ALIMENTACIÓN

Su dieta es muy variada, ya que se alimentan de frutas, semillas, huevos de otras aves, lagartijas y pequeños roedores.



FOTOGRAFÍA — CARLOS NUÑO PULIDO · PAUL JONES

Loro Cachete Amarillos

Amazona autumnalis (Linnaeus, 1758)

DIURNA

DESCRIPCIÓN

Se trata de un ave de tamaño medio midiendo entre 30 a 38 cm y pesando entre los 310 a 480 gramos. Posee un cuerpo de color verde uniforme. En la zona de la cabeza presentan un parche de color rojo enfrente de los ojos, poseen una corona de color azul claro que se extiende hasta cuello y en la zona de las mejillas tienen una coloración amarilla que puede, o no, ser visible. Las alas presentan un parche de color rojo en la zona central y las plumas terminan en puntas de color azul. Su pico en forma de gancho es de color marfil con la parte inferior de color negro, la parte superior es más grande que la inferior.

DISTRIBUCIÓN

Se distribuye desde el Norte de México, por la zona del Golfo hasta el Norte de Ecuador y Venezuela.

ALIMENTACIÓN

Se alimentan de frutas, semillas, pequeños lagartos, huevos, bayas, etc.



FOTOGRAFÍA — CARLOS NUÑO PULIDO

Perico Alas Amarillas

Brotogeris jugularis (Muller, 1776)

DIURNA

DESCRIPCIÓN

Se trata de un ave de tamaño pequeño, midiendo entre los 12 a 20 cm y pesando entre los 50 a 65 gramos en promedio. Posee un cuerpo de color verde. Las alas tienen un parche de color café amarillo en la zona externa del ala, además de tener plumas de tonalidades azules. La cola presenta plumas de color verde con puntas azuladas. La zona del pecho y vientre es de un tono verde amarillento. El pico en forma de gancho es de color naranja.

DISTRIBUCIÓN

Se distribuye desde Chiapas, México hasta el Sur de Colombia y Venezuela.

ALIMENTACIÓN

Se alimentan de frutas, bayas y semillas.



FOTOGRAFÍA — CARLOS NUÑO PULIDO

Loro Frente Roja

Psittacara finschi (Salvin, 1871)

DIURNA

DESCRIPCIÓN

Se trata de un ave de tamaño medio midiendo entre 28 cm en promedio y pesando hasta 150 gramos. Posee un cuerpo de color verde hoja. El interior de las alas presenta un color amarillo, y un pequeño parche rojo en la zona superior del ala. El interior de la cola es de color amarillo. En la cara presenta un parche rojo vivo enfrente de los ojos. El pico que presenta es curvo hacia abajo, la parte superior es más grande que la inferior y tiene una coloración rosa muy pálido.

DISTRIBUCIÓN

Se distribuye desde el Sur de Honduras, hasta el Sur de Panamá.

ALIMENTACIÓN

Se alimenta de frutos, bayas, semillas, reptiles pequeños, huevos, etc.



FOTOGRAFÍA — CARLOS NUÑO PULIDO

Gallineta Morada

Porphyrio martinica (Linnaeus, 1766)

DIURNA

DESCRIPCIÓN

Se trata de un ave de tamaño medio midiendo entre los 27 a 36 cm y pesando de 200 a 290 gramos. Posee un cuerpo de color azul-morado. Las alas son de un color verde delineadas por plumas de color verde azulado. Las patas son de color amarillo intenso, largas y con dedos expandidos que les sirven para caminar sobre plantas acuáticas. La cola es de color blanco. En la cabeza presenta un parche de color blanco enfrente de los ojos y el pico es de color rojo terminando en un color amarillo. Los juveniles no presentan ninguna de estas características, ellos son de colores apagados, casi llegando al café.

DISTRIBUCIÓN

Se distribuye desde el Noroeste de Estados Unidos, el Caribe hasta el Sur de Brasil.

ALIMENTACIÓN

Se alimentan de insectos, semillas, flores y plantas acuáticas.



FOTOGRAFÍA — MARCO VALENTINI · JESÚS BARREDA

Chiricoca

Aramides cajaneus (Muller, 1776)

DIURNA

DESCRIPCIÓN

Se trata de un ave de tamaño medio midiendo entre los 33 a 40 cm y pesando entre los 350 a 490 gramos. Posee un cuerpo de color naranja sucio, el cuello y la cabeza es de color gris. Las alas son de color verde oliva. La cola es de color negro. Las patas alargadas son de color tinto, su pico es de color amarillo y tiene ojos de color rojo intenso.

DISTRIBUCIÓN

Se distribuye desde el Sur de Nicaragua, hasta el Sur de Brasil.

ALIMENTACIÓN

Se alimentan de insectos, crustáceos pequeños, caracoles, reptiles pequeños, semillas, bayas y granos.



FOTOGRAFÍA — CARLOS NUÑO PULIDO · CONNIE LENTZ

Aracari

Pteroglossus frantzii (Cabanis, 1861)

DIURNA

DESCRIPCIÓN

Se trata de un ave de tamaño medio midiendo entre los 45 cm en promedio y pesando de 225 a 280 aproximadamente. Posee un cuerpo de color amarillo pálido, en la zona ventral tiene un cinturón de color rojo intenso, en la zona de las patas tiene un color café, en la zona del pecho poseen un parche de color negro, bordeado de plumas rojas. Las alas son de un color negro azabache. La cabeza es de color negro identificado al de las alas, además de un delineado de color rojo en la zona de los ojos. La zona de la espalda es de color rojo. Su mayor característica es el pico largo en forma de "banano" o "canoa" representativo de la familia, este presenta una coloración naranja-amarilla en la zona superior y de color negro en la zona inferior. Sus ojos son de color amarillo.

DISTRIBUCIÓN

Se distribuye desde la mitad de Costa Rica, hasta el Norte de Panamá.

ALIMENTACIÓN

Se alimentan de frutas, semillas, huevos, lagartos pequeños e incluso de otras aves pequeñas.



FOTOGRAFÍA — LAURA LIZANO

Tucán Pecho Amarillo

Ramphastos ambiguus (Swaison, 1823)

DIURNA

DESCRIPCIÓN

Se trata de un ave de tamaño grande midiendo entre 53 a 56 cm y pesando entre 580 a 750 gramos en promedio. Presenta un cuerpo, alas y cola de color negro. En zona interior de la cola tiene una coloración roja y un plumón de color blanco. El pecho y cara son de color amarillo huevo. Su pico en forma de "Canoa" tiene una división perpendicular de colores, siendo la parte inferior de color café chocolate y la parte superior de color amarillo.

DISTRIBUCIÓN

Se distribuye desde el Sur de Honduras hasta Perú y al Norte de Colombia y Venezuela.

ALIMENTACIÓN

Se alimentan de frutas, semillas, huevos, pequeños reptiles y mamíferos, insectos, etc.



FOTOGRAFÍA — IAN K BARKER · OSCAR THOMAS

Charrán Negro

Chlidonias niger (Linnaeus, 1758)

DIURNA

DESCRIPCIÓN

Se trata de un ave de tamaño medio midiendo entre los 25 cm en promedio y pesando alrededor de 50 gramos. Presenta un cuerpo de color negro en la zona del vientre, hasta la cabeza. Las alas son de color gris. La cola es de color blanco, esta coloración la tienen en temporada reproductiva. Posee un pico delgado y alargado que termina en punta. Cuando no es temporada reproductiva, el color negro se reduce hasta una pequeña corona por detrás de los ojos, y el color negro del cuerpo se vuelve blanco.

DISTRIBUCIÓN

Se distribuye en la zona costera de México, hasta la zona costera de Surinam y Chile.

ALIMENTACIÓN

Se alimenta principalmente de peces e insectos.



FOTOGRAFÍA — DUBI SHAPIRO · CHUCK BERTHOUD

Tecolote Sabanero

Megascops cooperi (Ridgway, 1878)

NOCTURNA

DESCRIPCIÓN

Se trata de un ave de tamaño medio midiendo entre 20 a 26 cm y pesando entre 115 a 120 gramos. Presenta un cuerpo de color grisáceo pálido. Las alas tienen un tono de color café claro, presenta dos pequeños cuernos de plumas en la cabeza. Los ojos son de color amarillo y son muy grandes, como en la mayoría de los búhos.

DISTRIBUCIÓN

Se distribuye desde Oaxaca, México hasta la mitad de Costa Rica.

ALIMENTACIÓN

Se alimentan de animales más pequeños, como reptiles, mamíferos y otras aves.



FOTOGRAFÍA — JON IRVINE · GUILLERMO SABORIO VEGA

Búho Café

Strix virgata (Cassin, 1849)

NOCTURNA

DESCRIPCIÓN

Se trata de un ave de tamaño grande midiendo entre 28 a 38 cm y pesando entre los 175 a 345 gramos aproximadamente. Presenta una coloración en la zona ventral y del pecho de color café claro. Las alas y cola presentan un tono de café más oscuro que del cuerpo. La cabeza presenta el mismo tono café de las alas, y la cara es un poco más pálida en relación con el cuerpo. Presenta plumas moteadas a lo largo del cuerpo.

DISTRIBUCIÓN

Se distribuye desde el Norte de México hasta el Sur de Brasil.

ALIMENTACIÓN

Se alimentan de animales más pequeños, como mamíferos, reptiles y aves.



FOTOGRAFÍA — WILLIAM ORELLANA · ECOS DEL BOSQUE

Búho de Anteojos

Pulsatrix perspicillata (Latham, 1790)

NOCTURNA

DESCRIPCIÓN

Se trata de un ave de tamaño grande, midiendo entre 43 a 52 cm y pesando entre 550 gramos a 1.25 kilogramos aproximadamente. Presenta un cuerpo de color crema. Las alas y cola son de un color marrón con plumas moteadas. La cabeza presenta el mismo tono que el de las alas. La cara es de color blanco y presenta dos parches de color negro en cada ojo. Presenta un pequeño collar de color marrón en el cuello. Los ojos son de un tono amarillo. Los juveniles presentan una coloración blanca en las zonas marrones de los adultos, y un tono negro en las alas y cola.

DISTRIBUCIÓN

Se distribuye desde el Sur de México hasta el Norte de Argentina.

ALIMENTACIÓN

Se alimentan de presas más pequeñas que ellos, como roedores, reptiles, aves, peces, etc.



FOTOGRAFÍA — JORGE DANGEL · JULIÁN ARBELÁEZ ARISTIZÁBAL

Búho Gritón

Asio clamator (Vieillot, 1808)

NOCTURNA

DESCRIPCIÓN

Se trata de un ave de tamaño grande midiendo entre los 30 a 38 cm y pesando entre los 320 a 550 gramos. Presenta un cuerpo de color blanco a café claro, con varias motas de color negro y blanco. Las alas y cola son de tonalidades un poco más oscuras en comparación con el cuerpo, pero siempre presentando el diseño moteado. La cara está delimitada por un círculo de plumas negras, a su vez, la cara es de color blanco con pequeños parches cafés por debajo de los ojos. La zona posterior de la cabeza y la espalda tienen la misma coloración de las alas. Su característica más notable son los dos cuernos que presenta encima de los ojos, los cuales siempre son visibles.

DISTRIBUCIÓN

Se distribuye desde el Sur de México hasta el Sur de Brasil.

ALIMENTACIÓN

Se alimenta de presas pequeñas, como roedores, reptiles, peces, aves, etc.



FOTOGRAFÍA — MATTHEW SABATINE · TOM MURRAY

Batará Negra

Thamnophilus bridgesi (Sclater, 1856)

DIURNA

DESCRIPCIÓN

Se trata de un ave de tamaño pequeño midiendo entre los 15 a 17 cm y pesando hasta los 27 gramos. Posee un cuerpo de color negro azabache, el vientre es de un color más opaco. El los hombros presenta unos lunares de color blanco. La cabeza es relativamente grande en comparación de otras aves, y está aplanada. La hembra es de color gris.

DISTRIBUCIÓN

Se trata de una especie endémica de Centroamérica, encontrándose en Costa Rica y Panamá.

ALIMENTACIÓN

Se alimenta de artrópodos en general.



FOTOGRAFÍA — CARLOS NUÑO PULIDO

Semillero Variable

Sporophila corvina (Sclater, 1860)

DIURNA

DESCRIPCIÓN

Se trata de un ave de tamaño pequeño, midiendo entre los 9 a 12 cm y pesando entre los 9 a 13 gramos en promedio. La coloración que presenta los machos varía entre dos más comunes: La primera coloración siendo de color negro uniforme por todo el cuerpo, y la segunda que es: un cuerpo de color blanco, presente con un collar delgado en la zona del cuello, la mitad de la cara y detrás de las mejillas son blancas, dos diminutos parches blancos en cada ala y un pico pequeño y grueso de color negro (Este se ve presente en ambas coloraciones, al igual que los parches en las alas). Por su parte las hembras son de color café claro en el cuerpo, las alas pueden presentar tonalidades grises y la zona de la cabeza y espalda son de color café un poco más oscuro que el del cuerpo.

DISTRIBUCIÓN

Se distribuye desde Veracruz, México hasta el Norte de Perú.

ALIMENTACIÓN

Se alimentan principalmente de semillas y frutos, pero se les puede encontrar cazando insectos.



FOTOGRAFÍA — CARLOS NUÑO PULIDO · NICK DORIAN

Tangara Terciopelo

Ramphocelus passerinii (Bonaparte, 1831)

DIURNA

DESCRIPCIÓN

Se trata de un ave de tamaño pequeño, midiendo unos 16 cm en promedio y pesando alrededor de 30 gramos. El macho presenta un cuerpo de color negro azabache, la zona de la espalda baja y de la base de la cola, presenta una coloración rojo intenso, el pico y patas son de un color gris pálido. La hembra, tienen una coloración amarilla pálido, con parches naranjas en la zona del pecho y en la base de la cola. Las alas son amarillo sucio que terminan la pluma gris. La cola es de una coloración gris. La cabeza es de color gris.

DISTRIBUCIÓN

Se distribuye desde el Istmo de México hasta la mitad de Panamá.

ALIMENTACIÓN

Se alimentan de bayas, frutos, semillas, insectos y otros artrópodos que puedan capturar.



FOTOGRAFÍA — CARLOS NUÑO PULIDO

Tangara Azul

Thraupis episcopus (Linnaeus, 1766)

DIURNA

DESCRIPCIÓN

Se trata de un ave de tamaño pequeño, midiendo 16 cm en promedio y pesando de 27 a 45 gramos. Presenta un cuerpo con un color gris azulado. Las alas son de un tono de azul turquesa, que terminan en puntas negras, a su vez, presentan un parche pequeño de color blanco en la zona superior. La cola es de color turquesa, al igual que las alas.

DISTRIBUCIÓN

Se distribuye desde la zona centro de México hasta el Norte de Bolivia y a la mitad de Brasil.

ALIMENTACIÓN

Se alimentan mayormente de frutas, aunque se les encuentra cazando insectos.



FOTOGRAFÍA — JOSANEL SUGASTI · CLAUDIA BRASILEIRO

Semillero Voletina

Volatinia jacarina (Linnaeus, 1766)

DIURNA

DESCRIPCIÓN

Se trata de un ave de tamaño muy pequeño, midiendo entre los 10 cm aproximadamente y pesando entre 8 y 12 gramos en promedio. Los machos presentan un cuerpo de color azul marino con iridiscencia de manera uniforme. Las alas presentan un pequeño parche de color blanco, que al vuelo se puede notar. Las hembras en cambio, presentan un color café por todo el cuerpo. La zona del pecho es de un café más claro y las alas y cola presentan un café oscuro en las puntas. Ambos tienen un pico pequeño de color marfil.

DISTRIBUCIÓN

Se distribuye desde la mitad de México hasta el Sur de Brasil.

ALIMENTACIÓN

Se alimentan principalmente de semillas.



FOTOGRAFÍA — LOUIS BEVIER · DAVID IRVING

Tangara Palmera

Thraupis palmarum (Wied, 1821)

DIURNA

DESCRIPCIÓN

Se trata de un ave de tamaño pequeño, midiendo entre los 15 a 19 cm y pesando entre 27 a 50 gramos en promedio. Presenta un cuerpo de color verde olivo por todo el cuerpo. Las alas presentan parches cafés muy nítidos en la zona superior y terminan en puntas de color café oscuro. La cola es de un color café oscuro, esto en caso de los machos. Las hembras presentan todos casi grises en, dónde el macho, presenta su coloración verde oliva. Las alas de la hembra tienen una línea de color blanco que al vuelo es notable.

DISTRIBUCIÓN

Se distribuye desde el Norte de Nicaragua hasta el Sur de Uruguay.

ALIMENTACIÓN

Se alimentan de insectos, frutas y bayas.



FOTOGRAFÍA — MARCOS EUGENIO · MICHAEL STUBBLEFIELD

Platanero

Coereba flaveola (Linnaeus, 1758)

DIURNA

DESCRIPCIÓN

Se trata de un ave de tamaño pequeño midiendo entre los 10 a 13 cm y pesando hasta 20 gramos. Presenta un cuerpo de color amarillo sucio, la cola y las con de un color negro. La zona del cuello es de color gris-blanco. La cabeza es de color negro con dos "cejas" de color blanco arriba de los ojos y presenta un pico delgado curvado hacia abajo.

DISTRIBUCIÓN

Se distribuye desde Veracruz, México. El Caribe, hasta el Norte de Uruguay.

ALIMENTACIÓN

Se alimenta principalmente de néctar y flores, pero se le puede observar comiendo insectos y frutos.



FOTOGRAFÍA — MARY GOODART · RYAN ANDERSON

Semillero Cuelliblanco

Sporophila morelleti (Bonaparte, 1850)

DIURNA

DESCRIPCIÓN

Se trata de un ave de tamaño pequeño, midiendo entre los 10 a 12 cm y pesando entre los 9 a 13 gramos de peso. Presenta un cuerpo de color blanco con parche conectado a la zona de la espalda de color negro. Presenta un collar de color blanco en el cuello. La cola es de color negro y la base es de color blanco, extendiéndose hasta la espalda. Las alas son de color negro con dos franjas de color blanco. La cabeza es de color negro, con un pequeño bordeado blanco en los ojos. Las hembras son de un color amarillo verdoso muy pálido. Las alas tienen una tonalidad verde olivo pálido y terminan en plumas de color negro y café con dos franjas amarillentas en las alas. La cola es de color negro-café. Ambos presentan un pico corto y grueso, en el caso de machos y hembras los colores son gris y rosa pálido, respectivamente.

DISTRIBUCIÓN

Se distribuyen desde Texas, Estados Unidos hasta Panamá, siguiendo la zona del Golfo de México.

ALIMENTACIÓN

Se alimentan principalmente de semillas, aunque pueden cazar algunos artrópodos.



FOTOGRAFÍA — CARLOS NUÑO PULIDO

Ibis Blanco

Eudocimus albus (Linnaeus, 1758)

DIURNA

DESCRIPCIÓN

Se trata de un ave de tamaño grande midiendo, entre 54 a 70 cm y pesando entre 700 gramos a 1.050 kilogramos aproximadamente. Presenta un cuerpo de color blanco de manera uniforme. Las alas presentan puntas negras solo en la zona interna- superior de la misma. La cara es de color rojo sin plumas. Su pico es lo más característico de la especie, se trata de un pico largo y delgado que se curva hacia abajo de color rojo que termina de color negro. Presenta patas alargadas de color rojo similar al del pico.

DISTRIBUCIÓN

Se distribuye desde la zona Noreste de los Estados Unidos, el Caribe hasta el Norte de Perú y Venezuela.

ALIMENTACIÓN

Se alimentan de insectos acuáticos, ranas, caracoles, pequeños peces y crustáceos.



FOTOGRAFÍA — CARLOS NUÑO PULIDO · PETER HAWRYLYSHYN

Espátula Rosa

Platalea ajaja (Linnaeus, 1758)

DIURNA

DESCRIPCIÓN

Se trata de un ave de gran tamaño, midiendo entre los 70 a 85 cm y pesando entre los 1.2 a 1.8 kilogramos aproximadamente. Posee un cuerpo de color blanco en la zona del cuello y pecho, la zona posterior es de color rosado. Las alas son rosas y presenta un parche horizontal de color rosa mexicano. La cabeza tiene un bordeado de color negro en la zona de la nuca. La cara es de color amarillo con tonos anaranjados. Su principal característica es su pico, el cual se trata de un pico largo y delgado de color gris, el cual se aplana desde la mitad de este y siendo la punta la zona más plana del mismo. Presenta una patas de color rosa mexicano. Los hombros tienen un parche de color amarillo. Los juveniles tienen una coloración más opaca de rosado y una cara de color gris.

DISTRIBUCIÓN

Se distribuye desde el Noreste de los Estados Unidos, el Caribe hasta el Norte de Perú y Venezuela. Y una población en el Sur de Brasil.

ALIMENTACIÓN

Se alimentan de crustáceos.



FOTOGRAFÍA — CARLOS NUÑO PULIDO

Soterrey

Campylorhynchus capistratus (Lesson, 1842)

DIURNA

DESCRIPCIÓN

Se trata de un ave de tamaño pequeño midiendo entre los 17 cm en promedio y pesando entre 29 a 45 gramos. Presentan un cuerpo de color blanco crema. La espalda es de un color canela. Las alas y cola presentan el mismo color canela de la espalda, además de un patrón jaspeado con plumas blancas y negras. En la cara presentan dos líneas negras en los ojos, dos "cejas" arriba de esas líneas negras y una corona de color negro. Sus ojos son de color rojo. Su pico es alargado y delgado.

DISTRIBUCIÓN

Se distribuye desde Chiapas, México hasta el Sur de Costa Rica.

ALIMENTACIÓN

Se alimentan de insectos, larvas y arácnidos.



FOTOGRAFÍA — PABLO RE · PHILLIP EDWARDS

Cucarachero

Troglodytes musculus (Naumann, 1823)

DIURNA

DESCRIPCIÓN

Se trata de un ave de tamaño pequeño midiendo entre 10 y 13 cm y pesando 14 gramos en promedio. Posee un cuerpo de color café madera de manera uniforme. Las alas y la cola presentan un patrón jaspeado. Posee un pico delgado y curvo hacia abajo.

DISTRIBUCIÓN

Se distribuye desde el Istmo de México, hasta la Patagonia Argentina.

ALIMENTACIÓN

Se alimenta principalmente de insectos y semillas.



FOTOGRAFÍA — JOSIAH VERBRUGGE · CARLOS FUNES

Tordo Café

Turdus grayi (Bonaparte, 1838)

DIURNA

DESCRIPCIÓN

Se trata de un ave de tamaño medio midiendo entre 23 a 27 cm y pesando hasta 75 gramos en promedio. Posee un cuerpo de color marrón, con un vientre beige. Las alas terminan en puntas negras. En el cuello presenta unas rajas verticales muy débiles.

DISTRIBUCIÓN

Se distribuye desde el Norte de México, por la zona del Golfo hasta el Norte de Colombia.

ALIMENTACIÓN

Se alimentan de semillas, frutos, insectos, etc.



FOTOGRAFÍA — CARLOS NUÑO PULIDO

Bienteveo

Myiozetetes similis (Spix, 1825)

DIURNA

DESCRIPCIÓN

Se trata de un ave de tamaño pequeño midiendo entre 16 a 18 cm y pesando entre 24 a 32 gramos. Presenta un cuerpo de color amarillo verdoso. La zona de la espalda es de color café chocolate. Las alas y cola presentan el mismo tono de café que la espalda. Tiene una garganta de color blanco. Tiene unas franjas negras en cada ojo y dos "cejas" de color blanco arriba de éstas. Presenta una corona alargada de color negro con un diminuto parche rojo. Presenta un pico corto y angosto de color negro.

DISTRIBUCIÓN

Se distribuye desde la mitad de México hasta el Sur de Brasil.

ALIMENTACIÓN

Se alimenta de insectos, ocasionalmente de bayas y frutas.



FOTOGRAFÍA — JAN VAN DER VEER

Pecho Amarillo

Pitangus sulphuratus (Linnaeus, 1766)

DIURNA

DESCRIPCIÓN

Se trata de un ave de tamaño pequeño, midiendo entre 21 a 26 cm y pesando entre los 52 a 68 gramos en promedio. Presenta un cuerpo de color amarillo intenso. La zona de la espalda es de un color café. Las alas y cola son de un color café con puntas canelas. Presenta una garganta de color blanco. Posee dos franjas de color negro en los ojos, arriba de éstas presenta dos "cejas" de color blanco y una corona alargada de color negro con un diminuto parche de color amarillo. Su pico es delgado y alargado.

DISTRIBUCIÓN

Se distribuye desde el Sur de los Estados Unidos hasta la mitad de Argentina.

ALIMENTACIÓN

Se alimenta de peces, insectos, lagartijas, fruta, semillas y bayas.



FOTOGRAFÍA — CARLOS NUÑO PULIDO

Tirano Gris

Tyrannus melancholicus (Vieillot, 1819)

DIURNA

DESCRIPCIÓN

Se trata de un ave de tamaño pequeño, midiendo entre los 18 a 24 cm y pesando entre 30 a 45 gramos en promedio. Presenta un cuerpo de color amarillo intenso. Las alas y cola son de color café. La cabeza es de color gris y presenta una franja nítida de un tono más oscuro que se encuentra por detrás de los ojos. Tienen un pico largo y delgado que termina con una pequeña curva hacia abajo de color negro.

DISTRIBUCIÓN

Se distribuye desde el Noroeste de los Estados Unidos hasta la mitad de Argentina.

ALIMENTACIÓN

Se alimentan de frutas, bayas mayormente. Pueden cazar artrópodos, lagartijas y ranas y las empalan en espinas de árboles.



FOTOGRAFÍA — JAN VAN DER VEER

Mosquerón Picudo

Megarynchus pitangua (Linnaeus, 1766)

DIURNA

DESCRIPCIÓN

Se trata de un ave de tamaño pequeño midiendo entre 20 a 25 cm y pesando 70 gramos en promedio. Presentan un cuerpo de color amarillo intenso. Tienen una garganta de color blanco. La cabeza presenta dos franjas negras en los ojos y arriba de éstas presentan "cejas" de color blanco y una corona alargada de color negro. Las alas y cola son de color café. El pico es más ancho y grueso en comparación de otras especies de la misma familia. El cuerpo es más robusto.

DISTRIBUCIÓN

Se distribuye desde la mitad de México hasta el Sur de Brasil.

ALIMENTACIÓN

Se alimentan de insectos grandes, lagartijas, peces, frutos y bayas.



FOTOGRAFÍA — CARLOS ROSSELLO · CHRIS WOOD

Bienteveo Rayado

Myiodynastes maculatus (Muller, 1776)

DIURNA

DESCRIPCIÓN

Se trata de un ave de tamaño pequeño, midiendo entre los 20 a 25 cm y pesando entre los 36 a 50 gramos en promedio. Presenta un cuerpo de color blanco con rayas de color negras y cafés. Las alas presentan un diseño rayado de colores cafés y blancos. La cola presenta la misma coloración que las alas, además de plumas internas de color canela en la zona interior. La cabeza presenta dos franjas negras en los ojos y un par de "cejas" blancas arriba y por debajo de éstas. Presenta una corona de color negro en la cabeza. Su pico es alargado y delgado, un poco más ancho en la zona inicial y termina en una pequeña curva hacia abajo.

DISTRIBUCIÓN

Se distribuye desde Tamaulipas, México, siguiendo la zona del Golfo de México hasta el Sur de Brasil.

ALIMENTACIÓN

Se alimenta de insectos, lagartijas, ranas, frutos, bayas y semillas.



FOTOGRAFÍA — LUKE BERG · RYAN SHEAN

Titirijí

Todirostrum cinereum (Linnaeus, 1766)

DIURNA

DESCRIPCIÓN Se trata de un ave de tamaño pequeño midiendo entre 9 a 11 cm y pesando hasta 7 gramos en promedio. Posee un cuerpo de color amarillo. Las plumas de las alas son negras con contornos amarillos. La cola es negra con dos plumas blancas a los lados. La espalda presenta una coloración gris. La cabeza es de color negro. La garganta es del mismo color amarillo del cuerpo y posee un pico largo y aplanado.

DISTRIBUCIÓN Se distribuye desde el Istmo de México hasta el Sur de Brasil, y a la mitad de Perú.

ALIMENTACIÓN Se alimenta de insectos y artrópodos.



FOTOGRAFÍA — CARLOS NUÑO PULIDO · SHARIF UDDIN

Lechuza Común

Tyto furcata (Temminck, 1827)

NOCTURNA

DESCRIPCIÓN

Se trata de un ave de tamaño grande midiendo, entre los 29 a 45 cm y pesando entre 400 a 700 gramos en promedio. Presenta un cuerpo de color blanco crema. Las alas son de un tono canela con varios parches de color gris por toda el ala. La cabeza es de un tono canela y presenta una corona de color gris. La cara es de color blanco bordeada de plumas negras generando una ilusión de "Cara de Manzana". La cola es color canela con varias franjas horizontales de color café más oscuro.

DISTRIBUCIÓN

Se distribuye desde el Sur Canadá hasta la Patagonia Argentina.

ALIMENTACIÓN

Se alimenta de reptiles, mamíferos pequeños, peces y aves pequeñas.

Fuentes consultadas para cada especie

Renjifo Rey, J. M. *Rupornis magnirostris*.

Wiley, J. W., & Garrido, O. H. (2005). Taxonomic status and biology of the Cuban Black-Hawk, *Buteogallus anthracinus gundlachii* (Aves: Accipitridae). *Journal of Raptor Research*, 39(4), 1.

Sutter, J., Martínez A, W. E., Oliva T, F., Oswaldo J, N., & Whitacre, D. F. (2001). Diet and hunting behavior of the Crane Hawk in Tikal National Park, Guatemala. *The Condor*, 103(1), 70-77.

Renjifo Rey, J. M. *Dendrocygna autumnalis*.

Carazas, N., Podestá, J., Cotillo, A., Biodiversidad, E., & Turísticos, D. (2018). Primer registro de la Garcita Tricolor (*Egretta tricolor*) en el humedal costero Poza de La Arenilla, Callao, Perú. *Unión de Ornitólogos del Perú*, 13, 7-8.

Gianuca, D., Gianuca, A. T., & Vooren, C. M. (2012). Abundance, breeding and food of the Little Blue Heron *Egretta caerulea* (Aves, Ardeidae) in the Patos Lagoon estuary, a recently colonized area in southern Brazil. *Iheringia. Série Zoologia*, 102(1), 19-25.

Blanco-Pérez, E. (2018). Notas sobre comportamiento asociado a la alimentación de una pareja reproductora del Gavilán Habado *Rupornis magnirostris* en un área urbana de Caracas, Venezuela. *Revista Venezolana de Ornitología*, 8(1), 12.

Astorga-Acuña, J. D. D., & Mora, J. M. (2024). Two New Prey for the Gray Hawk, *Buteo plagiatus* (Schlegel, 1862). *Caribbean Journal of Science*, 54(1), 11-17.

Etzel, K. E., Theimer, T. C., Johnson, M. J., & Holmes, J. A. (2014). Variation in prey delivered to Common Black-Hawk (*Buteogallus anthracinus*) nests in Arizona drainage basins. *Journal of Raptor Research*, 48(1), 54-60.

Brenes, J. T. (2024). Primer registro de depredación de la rana *Smilisca baudinii* (Hylidae) por *Geranospiza caerulescens* (Accipitridae). *Revista REGENERATIO*, 3(1), 16-22.

Pineda, L., Pacas-Mejía, M., & Molina-Fuentes, R. (2021). Gavilán zancón (*Geranospiza caerulescens*) en el salvadoR. *pizaetuS*, 4.

Avilez, J. P., Aillapan, O. A., Perea, J., Rodríguez, V., & García, A. (2007). Sistemas de alimentación de patos muscovy (*Cairina moschata*) en agricultores mapuches chilenos. *Archivos de zootecnia*, 56(Su1), 503-506.

Renjifo Rey, J. M. Anhinga anhinga.

Molina Granoble, S. L. (2024). Estudio comparativo de los patrones conductuales de las especies del género *Egretta* presentes en laguna natural de Pacoa, Santa Elena.

Denis, D., Mugica, L., Acosta, M., & Jimenez, A. (2000). Morfometría y alimentación del Aguaitacaimán (*Butorides virescens*)(Aves: Ardeidae) en 2 arroceras cubanas. *Biología*, 14(2), 133- 140.

Lorenzón, R. E., Virgolini, A. L. R., & Beltzer, A. H. (2013). Ecología trófica de la Garza blanca *Ardea alba* (Pelecaniformes: Ardeidae) en un humedal del río Paraná, Argentina. *UNED Research Journal/Cuadernos de Investigación UNED*, 5(1), 121-127.

Forti Torrens, M. (2023). Ecología reproductora y uso espacio-temporal del hábitat de alimentación y reproducción por parte de la comunidad de garzas (Aves: Ciconiidae) de L'Albufera de Valencia, España (Doctoral dissertation, Universitat de València).

Hernández-Vázquez, S., & Fernández-Aceves, G. J. (1999). Reproducción de *Cochlearius cochlearius* (garza cucharón) y *Butorides virescens* (garza verde) en La Manzanilla, Jalisco, México. *Ciencias Marinas*, 25(2), 277.

Alberca Noriega, K. A. (2019). Estado de conservación de *Tigrisoma mexicanum*, *Buteogallus anthracinus* y *Rallus longirostris* en el santuario nacional Los Manglares de Tumbes-2019.

Wynne, J. J., & Cal, R. N. (2025). A Bare-throated Tiger-Heron (*Tigrisoma mexicanum*) hunts in a cave. *The Wilson Journal of Ornithology*, 137(2), 211-217.

Sánchez, N. V., & Martínez-Cascante, D. A. (2014). Patrones de forrajeo del cuyeo (*Nyctidromus albigollis*) en noches de luna, Palo Verde, Costa Rica. *Zeledonia*.

Barrios, E. M. P. (2023). Notas sobre la biología reproductiva de *Nyctidromus albigollis* (Aves: Caprimulgidae) en Santa Cruz, Bolivia. *Acta Zoológica Lilloana*.

Hirald, F., Delibes, M., & Donazar, J. A. (1991). Comparison of Diets of Turkey Vultures in Three Regions of Northern Mexico (Comparación de la Dieta de *Cathartes aura* en Tres Regiones del Norte de Mexico). *Journal of Field Ornithology*, 319-324.

Zegarra, V. H. C. (2022). Los cathartidos y su rol protagónico en los ecosistemas naturales. *Revista Ciencias Biológicas y Ambientales*, 1(1), 32-42.

Burchard, L. (1978). Estudio del jote (*Coragyps atratus foetens*, Liechtenstein) en valdivia: etología carroñera y rol en diseminación de agentes patógenos. *Archivos de Medicina Veterinaria*, 10(2), 111-127.

Ballejo, F., & De Santis, L. J. (2013). Dieta estacional del Jote Cabeza Negra (*Coragyps atratus*) en un área rural y una urbana en el noroeste patagónico. *El hornero*, 28(1), 07-14.

Campos, L. D. A. (2017). Aves de la cuenca del río Unión, Valle de El General, Costa Rica, con notas sobre las poblaciones de *Megaceryle torquata* (Aves: Alcedinidae). *Revista Biodiversidad Neotropical*, 7(2), 98-107.

Aranguren, C. I., & González-Carcacia, J. A. (2013). Primer registro confirmado del Martín Pescador Grande *Megaceryle torquata* (Alcedinidae) en una zona de páramo de la Cordillera de los Andes, Estado Mérida, Venezuela/First Confirmed Record of the Ringed Kingfisher *Megaceryle torquata* (Alcedinidae) in a Paramo Zone of the Andes Mountains, Mérida State, Venezuela. *Revista Venezolana de Ornitología*, 3(1), 5.

Renjifo Rey, J. M. *Megaceryle alcyon*.

Booth, H., Yruretagoyena, L., Kuruvilla, M., & Slager, D. L. (2021). On the marine feeding behavior and activity budgets of Belted Kingfishers (*Megaceryle alcyon*) during the post-fledging period. *The Wilson Journal of Ornithology*, 133(2), 291-295.

Bolaños Redondo, S. E., & Villareal Orias, J. (2008). Comportamiento de forrajeo de aves en el área de estanques de acuicultura de la estación experimental 28 millas, Bataán, Limón, Costa Rica.

Gantz, A. L. B. E. R. T. O., Sade, S. O. R. A. Y. A., & Rau, J. A. I. M. E. (2009). Winter diet and feeding preferences of the southern lapwing (*Vanellus chilensis*, Molina 1782) in pastures of southern Chile. *Boletín Chileno de Ornitología*, 15(2), 87-93.

Lozano, C. B., Cadena, H., Carceller, F., Criollo, S., Dí az-Martí nez, G., Durà - Lahoz, C., ... & Toalombo, J. E. (2025). ALIMENTACIÓN NOCTURNA DEL AVEFRÍA SUREÑA *Vanellus chilensis* (CHARADRIIDAE) EN ENTORNOS ANTRÓ PICAMENTE ILUMINADOS. *Revista Ecuatoriana de Ornitología*, 86-87.

Cárdenas-Avella, N. M., & Ayala-Ochoa, M. (2016). Primer registro del Gabán *Mycteria americana* en el estado Mérida, Venezuela. *Revista Venezolana de Ornitología*, 6, 55-57.

Orias, J. V., & Solera, A. J. (2008). Colonia de garzones (*Mycteria americana*) en un paisaje agrosilvopastoril del bosque seco, Costa Rica: Implicaciones en conservación. *Zeledonia*, 12(2), 8- 16.

Strewe, R., Villa-De León, C., Navarro, C., Alzate, J., & Utría, G. (2016). Primer registro documentado de la Torcaza aliblanca (*Zenaida asiatica*) en América del Sur: First documented record of the White-winged Dove (*Zenaida asiatica*) in South America. *Ornitología Colombiana*, (15), 90-93.

Muñoz, J., Marín, G., & Rodríguez, J. R. (2005). Dieta de tres especies de aves colúmbidas en un hábitat xerofítico litoral del Nororiente de Venezuela. SABER. Revista Multidisciplinaria del Consejo de Investigación de la Universidad de Oriente, 17(2), 215-223.

Romero-Zambrano, H., & Morales-Sánchez, J. E. (1981). Descripción de una nueva subespecie de *Leptotila verreauxi* Bonaparte, 1855 (Aves: Columbidae) del sureste de Colombia. Caldasia, 291- 299. Monterrubio. Rico, T. C., Villaseñor-Gómez, J. F., Álvarez-Jara, M., & Escalante-Pliego, P. (2016). Ecología y situación actual de la familia columbidae en la Reserva de la Biosfera Los Tuxtlas, Veracruz. Ornitología Neotropical, 27, 17-26.

Stiles, F. G., & Skutch, A. F. (2007). Guía de aves de Costa Rica. Editorial INBio.

Can, J. E. M. EL PAPEL DE LOS CRACIDOS (AVES: GALLIFORMES) COMO DISPERSORES Y DEPREDADORES DE SEMILLAS.

Yépez, G. (1967). Nota sobre la alimentación de *Crotophaga sulcirostris*. El Hornero, 10(4), 449-451.

Sazima, I., & Olmos, F. (2009). The Chimango Caracara (*Milvago chimango*), an additional fisher among Caracarini falcons. Biota Neotropica, 9, 403-405.

Nunes, F., & Blanco-Pérez, E. (2024). Nuevas notas sobre la conducta reproductiva y dieta del Halcón Aplomado *Falco femoralis* en un ambiente urbano de Caracas, Venezuela. Revista Venezolana de Ornitología, 14, 43-53.

Idoeta, F. M., & Roesler, I. (2012). Presas consumidas por el carancho (*Caracara plancus*) durante el periodo reproductivo, en el noroeste de la provincia de Buenos Aires. Nuestras Aves, (57), 79- 82.

Vargas, R. J., Bó, M. S., & Favero, M. (2007). Diet of the southern caracara (*Caracara plancus*) in Mar Chiquita reserve, Southern Argentina. Journal of Raptor Research, 41(2), 113-121.

Costa, H. C., Lopes, L. E., de Freitas MARÇAL, B., & Zorzín, G. (2014). The reptile hunter's menu: A review of the prey species of Laughing Falcons, *Herpetotheres cachinnans* (Aves: Falconiformes). North-Western Journal of Zoology, 10(2), 445.

Paz, J. A., Copello, S., Mariano y Jelichich, R., Ranzoni, E., Veiga, J. O., & Seco Pon, J. P. (2019). Nuevos registros de Ave Fragata (*Fregata magnificens*) en la costa atlántica, Provincia de Buenos Aires, Argentina.

Buschbeck, M. V. (2026). Comportamiento de la fragata tijereta (*Fregata magnificens*) en relación con los cuerpos de agua continentales en Baja California Sur.

- Vázquez-López, M., Zamudio-Beltrán, L. E., Ramírez-Barrera, S. M., Escalante-Pliego, P., & Hernández-Baños, B. E. (2026). Genomic structure, phenotypic variation and drivers of diversification in *Euphonia hirundinacea* (Aves: Fringilidae). *PeerJ*, 14, e20916.
- Cooper, J. C. (2024). Ecological niche divergence or ecological niche partitioning in a widespread Neotropical bird lineage. *PeerJ*, 12, e17345.
- Ahumada-Cervantes, R., González-Márquez, L. C., & Hansen-Rodríguez, I. R. (2025). Characterization of bird communities in four riparian habitats along the Sinaloa River, northwest Mexico. *Biodiversity*, 26(2), 181-194.
- DornasI, T., NeresII, A. R., Silvall, D. S., & de Oliveirall, C. D. Determinação de zonas de contato entre duas espécies do gênero *Leistes* (Vigors, 1825) (Passeriformes: Icteridae) na América do Sul Determination of contact zones between two species of the genus *Leistes* (Vigors, 1825) (Passeriformes: Icteridae) in South America.
- Quiroz, F. H. C., Villalaz, V. A. V., Ruiz, N., & Rodríguez, R. A. C. (2025). Actividad alimenticia del Changamé (*Quiscalus Mexicanus*) en ecosistema urbano. *REA: Revista Científica Especializada en Educación y Ambiente*, 4(2), 12-28.
- Quiroz, F. H. C., Villalaz, V. A. V., Ruiz, N., & Rodríguez, R. A. C. (2025). Actividad alimenticia del Changamé (*Quiscalus Mexicanus*) en ecosistema urbano. *REA: Revista Científica Especializada en Educación y Ambiente*, 4(2), 12-28.
- Rand, A. L. (1960). Races of the Short-tailed Hawk, *Buteo brachyurus*. *The Auk*, 77(4), 448-459.
- Montalvo, E., & Carvajal, V. (2020). El Simsonite tropical.
- MacGregor-Fors, I., Schondube, J. E., Morales-Pérez, L., & Quesada, J. (2008). Ampliación del ámbito geográfico-altitudinal y uso de hábitats suburbanos por la mascarita pico grueso (*Geothlypis poliocephala*). *Revista mexicana de biodiversidad*, 79(2), 533-534.
- Ríos-Saldaña, A. E., & Ríos-Saldaña, C. A. (2013). Primer registro de la mascarita pico grueso (*Geothlypis poliocephala*) para el estado de Nuevo León, México. *Huitzil*, 14(2), 79-83.
- Miller, A. H., & Miller, V. D. (1968). The behavioral ecology and breeding biology of the Andean sparrow, *Zonotrichia capensis*. *Caldasia*, 83-154.
- Lougheed, S. C., Campagna, L., Dávila, J. A., Tubaro, P. L., Lijtmaer, D. A., & Handford, P. (2013). Continental phylogeography of an ecologically and morphologically diverse Neotropical songbird, *Zonotrichia capensis*. *BMC Evolutionary Biology*, 13(1), 58.

Jiménez, A. F., & Odio, R. M. M. (2023). Anidación del perico frentirrojo (*Psittacara finschi*) en edificaciones del Gran Área Metropolitana de Costa Rica. *Zeledonia*, 27(2), 11-21.

Charruau, P., & MacKinnon, B. (2009). Observación de *Porphyrio martinica* en la Reserva de la Biosfera Banco Chinchorro, Quintana Roo, México. Unpublished report, El Colegio de la Frontera Sur, México.

Mc Mullan, W. N. *Aramides cajaneus*.

Marcondes, R. S., & Silveira, L. F. (2015). A taxonomic review of *Aramides cajaneus* (Aves, Gruiformes, Rallidae) with notes on morphological variation in other species of the genus. *ZooKeys*, (500), 111.

Arias-Campos, L. D. (2015). Frutos consumidos por *Pteroglossus frantzii* (Ramphastidae) fuera del bosque en el Valle de El General, Costa Rica. *Zeledonia*, 19(2), 88.

Mora, J. M., & López Umaña, L. I. (2020). A strong case of dilution in the Yellow-throated Toucan (*Ramphastos ambiguus*). *Huitzil*, 21(2).

Moreira, J. I., Riba-Hernández, P., & Lobo, J. A. (2017). Toucans (*Ramphastos ambiguus*) facilitate resilience against seed dispersal limitation to a large-seeded tree (*Virola surinamensis*) in a human-modified landscape. *Biotropica*, 49(4), 502-510.

Van Der Winden, J. (2002). The odyssey of the Black Tern *Chlidonias niger*: migration ecology in Europe and Africa. *Ardea*, 90(3), 421-435.

Máñez, M., Molina, B., Pérez-Aranda, D., Ibáñez, F., García, L., & Garrido, H. (2004). Fumarel común *Chlidonias niger*. *LIBRO ROJO*, 259.

Camacho-Varela, P., & Arguedas-Porras, R. (2017). The owls of Costa Rica. In *Neotropical Owls: Diversity and Conservation* (pp. 291-315). Cham: Springer International Publishing.

Dantas, S. M., Weckstein, J. D., Bates, J. M., Krabbe, N. K., Cadena, C. D., Robbins, M. B., ... & Aleixo, A. (2016). Molecular systematics of the new world screech-owls (Megascops: Aves, Strigidae): biogeographic and taxonomic implications. *Molecular Phylogenetics and Evolution*, 94, 626-634.

San Martín-Cruz, M. A., Villegas-Patraca, R., Dáttilo, W., Enriquez, P. L., & Inzunza, E. R. (2024). Occupancy dynamics of the mottled owl *Strix virgata* using object-based image analysis along an urbanized neotropical gradient. *Global Ecology and Conservation*, 55, e03243.

Mc Mullan, W. N. *Pulsatrix perspicillata*.

Wioneczek, M. J., Pradier, L. S., Llorens, P. R., Castillo, L., Cabral, F., Cárdenas, A., ... & Malczewski, M. (2022). Lechuzón Mocho Grande (*Pulsatrix perspicillata*) en el departamento Iguazú, Misiones Argentina. *Nuestras Aves*, (67), 33-39.

Pautasso, A. A., & Martín, R. (2001). Observaciones sobre la biología reproductiva de *Asio clamator* en el centro de Argentina. *El Hornero*, 16(1), 43-46.

Ocampo, D., Winker, K., Miller, M. J., Sandoval, L., & Uy, J. A. C. (2023). Replicate contact zones suggest a limited role of plumage in reproductive isolation among subspecies of the variable seedeater (*Sporophila corvina*). *Molecular Ecology*, 32(13), 3586-3604.

Skutch, A. F. (1950). Outline for an ecological life history of a bird, based upon the Song Tanager *Ramphocelus passerinii costaricensis*. *Ecology*, 31(3), 464-469.

Blancas-Calva, E., Blancas-Hernández, J. C., Castro-Torreblanca, M., & Cano-Nava, G. A. (2017). La tángara azul gris (*Thraupis episcopus*) en el estado de Guerrero, México. *Huitzil*, 18(2), 232-237.

Moreno-Palacios, M., Losada-Prado, S., & Echeverry-Galvis, M. Á. (2013). Ciclos de reproducción y muda del volatinero negro (*Volatinia jacarina*) y el semillero gris (*Sporophila intermedia*) en un matorral secundario al norte del Tolima, Colombia. *Ornitología neotropical*, 24(4), 421-431.

Monteleone, D., Areta, J. I., Roesler, I., Bodrati, A., & Grilli, P. (2010). Primer registro documentado y nuevos datos del Choguí Oliváceo (*Thraupis palmarum*) en Argentina. *Nuestras Aves*, (55), 25-28.

González, O. (1998). *Coereba flaveola*, UNAVE NUEVA EN EL ECOSISTEMA DE LOS PARQUES DE LA CIUDAD DE. *Ecología*, 1, 1.

De Schauensee, R. M. (1952). A review of the genus *Sporophila*. *Proceedings of the Academy of Natural Sciences of Philadelphia*, 104, 153-196.

Frederick, P. C., Bildstein, K. L., Fleury, B., & Ogden, J. (1996). Conservation of large, nomadic populations of White Ibises (*Eudocimus albus*) in the United States. *Conservation Biology*, 10(1), 203-216.

Bonilla Poveda, C. (2022). *Espátula Rosada (Platalea ajaja)*.

Barker, F. K. (2007). Avifaunal interchange across the Panamanian isthmus: insights from *Campylorhynchus* wrens. *Biological Journal of the Linnean Society*, 90(4), 687-702.

Recuerda, M., Kopuchian, C., Fracas, P. A., Tubaro, P. L., Campagana, L., & Lijtmaer, D. A. (2026). Continental diversification and insular speciation in a widespread passerine (*Troglodytes musculus*) in southern South America. *Molecular Phylogenetics and Evolution*, 108544.

Vargas-Castro, L. E., Sánchez, N. V., & Barrantes, G. (2012). Repertoire size and syllable sharing in the song of the Clay-colored Thrush (*Turdus grayi*). *The Wilson Journal of Ornithology*, 124(3), 446-453.

Dyrce, A. (1983). Breeding ecology of the Clay-coloured Robin *Turdus grayi* in lowland Panama. *Ibis*, 125(3), 287-304.

Madrid, J. L. M., Medina, L. A. C., Hidalgo, C. T., & Caballero, P. L. C. (2021). Dieta y nuevos registros de frugivoría del Mosquero Social (*Myiozetetes similis*) en Panamá. *Zeledonia*, 25(1), 116-130.

Latino, S., & Beltzer, A. H. (1999). Ecología trófica del benteveo *Pitangus sulphuratus* (aves: Tyrannidae) en el valle de inundación del río Paraná, Argentina. *Orsis: organismes i sistemes*, 69-78.

Pinheiro, C. E. (1996). Palatability and escaping ability in Neotropical butterflies: tests with wild kingbirds (*Tyrannus melancholicus*, Tyrannidae). *Biological Journal of the Linnean Society*, 59(4), 351-365.

Merlo, J. L., & Aleman, S. (2010). El Pitanguá (*Megarynchus pitangua*) en Buenos Aires. *Nuestras Aves*, (55), 22-23.

Mc Mullan, W. N. *Myiodynastes maculatus*.

Bosso, A. (2001). *Todirostrum cinereum* (Tyrannidae), una nueva especie para la avifauna argentina. *El Hornero*, 16(1), 49-50.

Ortiz, P. E., González, F. R., & Jayat, J. P. (2017). Ecología trófica de la lechuza del campanario (*Tyto furcata*) en las Yungas del noroeste argentino. *Ecología austral*, 27(3), 364-374.

Krings, M., Nyakatura, J. A., Fischer, M. S., & Wagner, H. (2014). The cervical spine of the American barn owl (*Tyto furcata* *pratincola*): I. Anatomy of the vertebrae and regionalization in their S-shaped arrangement. *PloS one*, 9(3), e91653.